

藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數
一九·五%安特靈乳劑	二〇—三〇公升	五〇倍—八〇倍
五〇%加保利(賽文)可濕性粉劑	二—六公升	五〇倍
三%rBHC粉劑	四—五公升	
一·五%加保利(賽文)粉劑	四—五公升	

一、防治成蟲：撒佈五——一〇%DDT或一%
r B H C粉劑每公頃每次用藥量四〇——五〇公斤。
二、防治幼蟲：插秧前撒佈於莖。

藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數
二五％DDD T 乳劑	〇・壹—〇・九六公升	一、二五倍
七五％DDD T 可濕性粉劑	〇・三一—〇・三三公升	三、七五倍
六・五％r B H C 可濕性粉劑	一・〇—二・〇公升	四〇〇—八〇〇倍
一〇％DDD T 粉劑	二〇—二五公升	
一％r B H C 粉劑	四〇—四六公升	

稻螟蛉、鐵甲蟲、負泥蟲、稻縱捲葉蟲、稻苞蟲、臺灣夜盜蟲等

一、發生初期撒佈一〇%DDT或一%r B H C粉劑，每公頃四〇—六〇公斤或二五%DDT乳劑五〇〇倍稀釋液，每公頃用藥量一・六—二・四

雜
草
稗
子

水田表面應整平，若已有雜草應盡量除去，插秧後少部份雜草之第一葉發現時（第一期作插秧後約五至七天，第二期作插秧後約三至五天）田面保持約三公分之水，均勻撒布藥劑於田面一次（藥劑種類及使用量如附表）施藥後田面繼續保持積水三公分（積水期間如附表）

藥劑種類	每公頃	稀釋倍數	備註
五〇多谷 三〇公斤	五〇多谷 三〇公斤	五〇多谷 三〇公斤	施藥後積水三十五天 殺死已成長的什草不易 盡殺除，故應在整地時 之殺草，能對三角草 菜等稗仔、貓毛草、學 較佳，但對田字草無 除草效果，故應在整 地時以手拔，其地下 用。對各種土質均可適
五〇多加 二公斤 四五〇倍	五〇多加 二公斤 四五〇倍	五〇多加 二公斤 四五〇倍	施藥後積水二十三天 除草對已成長的什草之 整地除果不佳，應於 田之大部分重要什草 果，均有良好之殺草效 用，故在整地時以手拔 地，於整地時以手拔 用於太砂之水田以免 發生藥害。
靈稗乳劑 五公升	靈稗乳劑 五公升	靈稗乳劑 五公升	施藥時期：雜草未萌 芽前（第一期作插秧 後約四十五天，第二期 作三十四天）

水稻秧田稗子

殺草劑名稱	每公頃施用藥量	稀釋倍數	施用方法	備註
一一％克靈稗乳劑	十二公升	三五倍	播種後當噴灑於床面	使用時苗面排除積水

殺草劑	每公頃施	稀釋	施用方法及	備
名稱	用量	倍數	時期	註
三五五四	一五〇			
思登三五	〇〇公		需藥兩次第一、應用於	
四乳劑	升(兩次		第一次在秧苗	
共用量)			第一次在第一次	
			第二期作因	

旱地雜早

殺草劑	每公頃	施用方法	備註
名稱	施藥量	稀釋倍數	及時期
乳劑	六〇—一五〇公升	一〇—一〇〇倍	播種後澆水於土表
多量	六〇—一五〇公升	一〇—一〇〇倍	粘質土壤用二〇〇公升
五穀	六〇—一五〇公升	一〇—一〇〇倍	乾土壤用二〇〇公升

殺草劑	每公頃	稀釋倍數	施用方法	備註
名稱	施藥量	及時期		
八六六	一二·一公	播種後	適用于苗、粟以北	
可濕性粉劑	五公	噴澆土	地區粘質土壤過	
	斤	畦表	地一五公	
			斤藥	
			壟用二〇〇	
			倍稀釋。	

使用右列殺草劑應注意左列事項：

①宿根性雜草不受藥劑控制故整地時應徹底根