


擬尺蠖放大圖(唐少銘攝)



青椿象

藥劑名稱	稀釋倍數	施用時期	備註
五〇%速滅松乳劑	1,000倍	採收前十天停止使用	在若蟲期施用藥務使濃度準確
DDVT乳劑	2,000倍	採收前四天停止使用	同右

紅蜘蛛

豆類在開始採收前以一八·五%開路生可濕性粉劑加水五百倍防治。

花生葉斑病

(暫行方法)

本病於秋作較易發生，播種後如有發病，應使用殺菌劑一次，以後每十天噴射一次，繼續四次。用藥量及稀釋倍數如左表(任選一種)：

藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數
谷樂生M	三公斤	四〇〇倍
錳乃浦(大生二)	三公斤	四〇〇倍
大生 四五	三公斤	四〇〇倍
西藥生石灰	四〇公斤	四〇〇倍

花生紅蜘蛛

於發生初期噴射左表藥劑(任選乙種)防治一次，經十五天後再噴射一次，但施藥時必須自側面噴於葉背，葉面、葉柄等各個部位。

為避免抗藥性之產生，三種藥劑應輪流使用。

藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數	備註
三五%殺速滅(益加達)乳劑	一·二五公升	八〇〇倍	
八〇%四達峰(鐵地旺)乳劑	一·六七公升	六〇〇倍	必須在發生前使用
二五%愛加蓋可濕性粉劑	一·二五公升	八〇〇倍	

倉庫害蟲

積穀害蟲

一、穀物入倉前，空倉應用二五%DDT乳劑十五至二十倍稀釋液噴射。

二、穀物入倉時，應用下列方法保護之：

(一)積穀用〇·二%「靈丹」浸孕粉劑一比八百或〇·一二五%「靈丹」浸孕粉劑一比五百或用五%「保滿丹」浸孕粉劑一比一千五百，綠豆用一比二千倍，拌合貯藏。

(二)留種用穀物，可用〇·二%「靈丹」浸孕粉

劑一比四百拌合貯藏。

三、獨立倉庫二公尺週圍內無住室，辦公廳及其他人畜活動處所之積穀，若發生害蟲時可用五五%「好達勝」(Phostoxin)片劑，投藥前以厚牛皮紙封閉倉窗及一切通氣孔，投藥後封閉倉門密閉三至五天，持倉內全無氧氣時方可啓用倉中穀物。

其處理方法如下：

(一)袋裝者，每噸使用量四至六片，(每片三公克，因倉庫之密閉情形而定)均勻散於堆袋間及表面。

(二)散裝者，每噸使用量四至六片，用投藥管插入穀堆中均勻投藥。

(三)積穀少量者每噸投藥量四至六片，並以膠布覆蓋密閉燻蒸。

(四)本劑僅用於公設倉庫，並由技術人員指導使用。

(五)民間倉庫絕對禁止使用。

甘藷簽害蟲

一、甘藷簽入倉前，空倉應用二五%DDT乳劑二十倍稀釋液噴射。

二、新製無蟲害之甘藷簽入倉時，用五%「保滿丹」浸孕粉劑按一比一千五百拌和。

三、貯藏中發生害蟲時，可參照積穀害蟲第三項辦法防治。

大豆銹病

大豆播種後二十至三十天或花蕾開始萌出時，隨即施用「大生四五」或「錳乃浦」(大生七八)或「錳乃浦」(大生二二)四百倍稀釋液一次，以後每隔七至十天施藥一次共四次，施藥時應噴射於葉片上下兩面，每公頃每次用藥量二·五至三公升。

「大生M四五」為含錳的「大生二二」，其殺菌作用，優於「大生七八」及「大生二二」或其混合劑，花蓮區農業改良場二年來的試驗結果，

(下接第三十六頁)