

防治積穀害蟲的新藥劑

好

達

勝

·樣林·



，通常施用後四小時起
分解作用，分解後崩壞
殘存灰白色無毒的粉末

施用方法四種

倉庫內的積穀或雜
糧發生積穀害蟲時，用
「好達勝」片劑燻蒸方
法如下：

(1) 大倉積穀散

堆儲放滿倉庫時，倉庫
僅留一倉門，供為投藥
工作出入外，四週門窗
及一切通氣孔，均以厚
牛皮紙封閉，壁頂與
屋頂下縫隙，用麻袋塞
密，按儲穀每噸使用「
好達勝」片劑四至六片
比例投藥。投藥位置靠
風頭較風尾增約一至二
片，平均分配放在穀堆表面約每一公尺間距，用投
藥管插入穀堆內底層後，從上端管口投下藥片，而
將投藥管提起約每一公尺時再投下片劑。通常每公
尺層一次投下片劑約十五片左右，但投藥量與位置
務求均勻。投藥後，關閉倉門密封。經燻蒸
三至五天後即可開倉。

(2) 小倉積穀散堆燻蒸：儲放在大倉
內的隔間小倉間的少量積穀，將小倉四週氣
窗包括倉門木板縫與前法相同密閉，在投藥
後，為避免殺蟲效果低減，穀堆表面應加用
塑膠布覆蓋燻蒸，防止氣體散洩其他空倉中

(3) 袋裝雜糧儲放滿大倉燻蒸：先將
倉庫密封，方法與(1)相同。用「好達勝
」按每噸四至六片，均勻散投藥片於袋表面

、袋間及地面等。

(4) 少量袋裝雜糧燻蒸：儲放在大倉內少量
袋裝的雜糧，先用塑膠布覆蓋袋堆表面及四週，投
藥時拉開一面，方法與(3)相同，但務求投藥均
勻，然後，將預先準備的砂布長袋壓在四週地面塑
膠布，以防風吹開及鼠侵入氣洩減低殺蟲效力。

使用注意事項

使用「好達勝」片劑應注意下列各點：

(1) 燻蒸倉庫，應離開住房二公尺以上者，
而倉庫內無人住宿才可使用。

(2) 進行燻蒸時，應選擇晴天，因為降雨天
多濕，「好達勝」分解過快，將影響殺蟲效果。

(3) 投藥時，應增加人員投藥，以在一小時
內能投完全部藥片為宜，避免人員多留倉內。

(4) 投藥時，工作人員不可在倉內吸煙，並
應在投完藥片出倉後，用肥皂將手洗淨。

(5) 燻蒸時，應在倉庫外面打開藥罐，罐內
布包的乾燥劑有毒並能着火，應即叫人將該項有毒
乾燥劑深埋土中。

(6) 開罐後，應將片劑一次全部使用，以免
封存不密分解，或誤服的危險。

(7) 未開罐的藥片，應保存在乾燥冷暗的地
方，不可與食物或醫藥同放在一起。

燻蒸毒殺害蟲

「好達勝」是德國 Degesh 公司的出品，分為
含有五五五磷化鋁的燻蒸片劑，每片重約三公分，
及粒劑每粒重約〇・六公分兩種。

「好達勝」片劑能吸收穀物水分起分解，產生
一公分的無色有毒不發焰磷化三氫氣體，含有氫氧
化鋁、氮及二氧化碳而發生殺蟲作用。片劑的分解
作用緩慢，常受空氣中濕氣多少及溫度高低的影响



【管藥投「勝達好」】