

雛雞強弱不同，對溫度的要求也不一樣；強健的雛雞，比較喜歡低溫的地方，相反的，弱雛則喜歡高熱的地方，所以育雛器內應有一個溫度比較低的地方，讓弱雛感到過熱時可以躲避。

一般說來，健康的雛雞對高溫的抵抗力較弱，但是溫度的急變和過份的低溫也有壞的影響，應儘量避免。

當雛雞養到三星期時即可廢溫，早期廢溫二星期即已實行。廢溫要有技巧，不能突然廢溫，即首先利用中午天氣熱時開始廢溫二小時，然後漸次延長時間。

(2) 濕度：濕度高，對雛雞的健康和發育有害，而且容易引起各種疾病，所以育雛室應經常保持乾燥。孵化後一週內，要保持在六〇—七〇%的濕度，這樣羽毛的發育比較好。一週後因排糞量和飲水量的增加，濕度容易增高，所以應設法保持乾燥。

(3) 通風：由於保溫的關係，育雛室常有通風不良的現象。通風不良對雛健康影響很大，所以育雛室應特別注意通風，但應防止賊風，以免雛隻感冒。一般說來，通風和乾燥是併行的，即通風良好的雛舍就乾燥。

(4) 飼料：雛雞時時都在吃飼料，所以一般都採取不斷給飼法。但其食量，來航雛第一週約六十三公分，第二週約一百二十五公分……第十週七百公分。


初生雛雞體內有卵黃，供孵化後的營養，因此，剛孵化時不要喂料，等到四十五小時後再喂料比較適當，但最好不要超過七十小時。最初喂料時，利用牛皮紙，在上面散放飼料，讓小雞啄食。最初只有一二隻啄食，後來漸次增多。至全部會吃飼料，然後再將飼料放在飼料槽給飼。水最好放在容易看到的地方，但不要使雛弄濕羽毛為佳。氣候特別寒冷時，最好供給微溫的熱水。

幼雛常見的疾病

(1) 球蟲病：四—八週間最容易發生，易由氣候的變化或環境的改變誘發，病雛排出血便，為最顯著的病徵，其次是下痢，有時脚部會麻痺。死雞解剖時盲腸充血，腸壁有血斑，雞糞在顯微鏡下可以看到原蟲的卵。

(2) 雛白痢：由雛白痢菌感染而發病，雛雞感染，恢復後終生帶菌，大約是在孵化後瞬間受感染。感染後下灰白色的便，附着於肛門附近或塞住肛門，病雛食欲減退，兩翼下垂，死亡率八〇—一〇〇%。預防的方法，最好利用診斷液檢出帶菌的母雞或公雞。

(3) 白喉：是一種傳染病，中雛發病較多，氣溫急變及通氣不良時尤易發生。病雛的



藥 農 牌 豐 正

◆ 蔬菜·水稻·菸草·果樹·雜糧蟲病防治 ◆

- 可美農乳劑
- 永利農乳劑
- 機械油(夏油)
- 美果素乳劑
- 拜耳多乳劑
- 無敵松乳劑
- 可樂收乳劑
- 利必乳劑
- 特殺松乳劑
- 能敵師乳劑
- 美粒松乳劑
- 寶利多乳劑
- 新滅菌液劑



誠實服務
信用最好
效能最強

正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峯 電話六三號