

眼、鼻、口受侵害而腫大，流粘液，甚至失明。預防方法：不要讓鷄羣患感冒，隔離健康鷄。


(4) 鷄痘：在臺灣整年都會發生，在沒有毛的部位發生痘瘡，由一種慮過性病毒所引起，預防接種有效，治療以外科療法即可。

(5) 腳弱症：由飼料中維他命或礦物質成份不足，或遺傳而發生。床面堅硬時比較容易發生。

(6) 喙況：由光線較暗的地方移至明亮的地方，一時也會發生。或由於營養不平衡而發生。防治法以切喙法最為有效。或將被喙的病鷄隔離，塗上木溜油亦可。降低蛋白質與熱能的比率，亦可防止此症發生。

訂正

上期第二十六頁利用農耕機械栽培牧草一文作者，應訂正為「楊添丁」。又第十五頁作者介紹陸錦標名下最後一句「泰國」二字更正為「桑園」。



真方便！  
真有效！

率效用利料飼的鷄肉

△肉鷄飼料費用，在總生產成本中佔到六〇—七〇%，所以，飼料利用效率的改善，對整個生產成本的影響是很大的。請參看下面附表一。

△肉鷄的飼料利用效率，隨著飼養週齡之增加而降低，所以飼養肉鷄，應把握適當時機，在經濟性最高的時候出售。請參看下面附表二。(林振衣)

表一：肉鷄飼料利用效率與成本的關係

飼料利用效率改善	飼料節省	飼料費佔六〇%時成本降低	飼料費佔七〇%時成本降低
三·五↓三·三	一五%	九%	一一·五%
三·五↓二·五	三〇%	一八%	二一·〇%
三·五↓二·〇	四三%	二六%	三〇·一%

表二：肉鷄大小與飼料利用效率的關係

週齡	五	六	七	八	九	一〇
生體重(公分)	五〇〇	六五〇	八五〇	一、〇五〇	一二五〇	一、四五〇
各週增體重(公分)	一五〇	一五〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇
飼料效率	二·一二	二·三二	二·四	二·五	二·七	二·九

請用安全可靠的水田除草劑

**多谷粒劑** TOK Granular (農藥登記證第663號)

- ◎植物保護審議會，農林廳推廣水田用除草劑。
- ◎每甲地用藥量30公斤，插秧後五—七天用手均勻撒佈即可，施藥後請保持田水深三分三公分，以後缺水亦不影響其殺草效果。
- ◎可與肥料、粉劑或粒劑農藥混合使用。
- ◎施用多谷粒劑後，完全不必再行人工除草。
- ◎對水稻不會發生藥害，對人畜、魚介類無害，可安全使用。

說明書函索即寄

現貨供應處：臺中縣霧峰鄉草湖路二號 (電話63號)  
**正豐化學股份有限公司**  
 臺灣總代理：臺北市郵政信箱第1643號 (電話36177號)  
**青象貿易有限公司**

標商記登司公斯哈門羅國美\*