

今 年 修 訂 的

植 物 保 護 新 方 法

(上接第十七頁)
藥效確勝於「大生二二」或「大生七八」經雜糧病理小組提請大會實在通過列入推廣。

大豆紫斑病

播種後五十天左右，如有本病發生時，噴射錳乃浦(大生二二)四百倍稀釋液一次，以後每隔十天噴射一次，至收穫前半月止。如遇雨，應再噴射一次，每公頃每次用藥量二至三公斤。

大豆害蟲

第一次噴藥：大豆幼苗本葉展開而第一複葉尚未展開時(夏作播種後一星期，春作秋作約二星期)噴射一九·五%「安特靈」乳劑五百倍稀釋液(夏作)或八百倍稀釋液(春秋作)預防潛蠅類及切根蟲等為害。

第二次噴藥：第一次噴藥後二十天，不論期作別，均再噴射一九·五%「安特靈」乳劑五百倍稀釋液，防蛀心蠅及夜盜蟲等。

第三次噴藥：大部份豆花凋謝，豆莢開始形成時，施用附表一藥劑(任選一種)防治豆莢螟為害。

第四次噴藥：第三次噴藥後二十天，施用附表二藥劑(任選一種)

防治豆莢螟及椿象類為害，至收穫前二星期為止。

玉米露菌病

一、在抗露菌病品種未推廣前發病嚴重地區暫勿栽種玉米。
二、玉米不可與甘蔗間作。
三、若發現病株時，隨即拔除燒燬，玉米園露菌病發病率達二〇%時，即予廢耕。

玉米螟

一、生育初期視玉米螟發生情形，噴射四五%「依必安」乳劑一千倍稀釋液一次，每公頃每次用藥量〇·八一公升。
二、玉米雄花抽穗前十至十五天噴射「在必安」一千倍稀釋液，每公頃每次用藥量一·一至一·二公升。
三、雄花抽穗時，拔除有蟲孔之穗，並立即燒却或埋沒，但不得超過全園場之二分之一。

二表附

一表附


藥劑名稱	每公頃每次用藥量	稀釋倍數
四七%大減速乳劑	一·二公升	一、〇〇〇倍
五〇%速減松乳劑	一·二公升	一、〇〇〇倍
五〇%加保利(賽文)可濕性粉劑	一·二公升	一、〇〇〇倍
四七%巴拉松乳劑	〇·六公升	二、〇〇〇倍
五〇%速減松乳劑	〇·六公升	二、〇〇〇倍
五〇%加保利(賽文)可濕性粉劑	一·二公升	一、〇〇〇倍



中農牌井關 KFG601 型耕耘機



祝您春節快樂 豐收發財



銷售總代辦處

永祥農機供銷公司

臺北市南陽街廿一號 電報掛號：5940
電話：26210·28331·23664

▲說明書函索即寄

製造廠

中國農業機械公司

臺北市南京東路一段十七號
電話：48479·48486