

栽培優良品種，只能種較佳之橫山中生梨，優良之口木品種生育不佳，產量亦低，不能經濟栽培。

〔問〕現有鴨梨品種正在試驗中，新世紀為目前最佳之品種，但抗病力較差。〔九州梨〕與「結川梨」品種不詳。栽培優良品種之梨，海拔在二千公尺左右生產最佳。（朱長志）

繁殖蛋黃果應用嫁接法

〔問〕：蛋黃果除播子外是否可用空中壓條繁殖，據新種蛋黃果說不能發根，有無特殊方法，或用何種藥劑可幫助發根。（南投竹山鎮竹山里前山路橫巷一三一號劉高）

〔答〕：蛋黃果播種的實生苗，到開花結果往往需要八、十年。嫁接苗約四年便可結果。一般多用嫁接繁殖。空中壓條和扦插等無性繁殖都不易生根，不宜採用。（張振甫）

桔柑

金柑砧木可用一枳殼或廣東檸檬

〔問〕：（一）金柑是屬於那一科、幾年生植物？（二）嫁接用什麼砧木？用酸柑可以嗎？（三）本省栽培前途如何？（四）何處較適合栽培？（南投中寮鄉清水村頂坑巷五號謝松溪）

〔答〕：（一）金柑在植物分類上屬於真正柑桔類，金柑屬（川中長三郎博士之分類法）屬於多年生植物。

（二）金柑砧木本省過去普遍採用酸柑，近年來亦有以廣東檸檬或枳殼作為砧木者。枳殼砧金柑，樹冠雖小，但結果早，果肉厚，加工率高；廣東檸檬砧金柑，結果早，果色鮮艷。致於酸柑與金柑之親和力尚佳，但樹勢過旺，結果量少，果色青，果實內水分多，不適於蜜餞加工。

（三）金柑除少部分供生食外，大部份用在蜜餞加工。目前試作者有果醬與糖漬等。若此等加工品可供外銷，即前途樂觀。

（四）金柑栽培地與一般柑桔同。惟過年期上稍有其實之故，不適於長期乾燥之地。（翁仁敏）

柑桔腐爛病株可行根接

〔問〕：（一）我在平地種的印子柑，有部份植株較弱者，於十一月就開花甚多，是否過早，正常開花期為何時？現在開花可否留果？留果後會影響正常花期嗎？（二）腐爛病發生很多，想根接，未知用何種根接苗比較適合？何時舉行最宜？據說根接苗種植時根接成活率較高，或者根接苗種後多久才可根接？（三）根接方法要怎樣做？（嘉義大保鄉南新村號李朝東）

〔答〕：（一）印子柑的正常開花期為二月中旬至四月初旬，目前開花是不正常的現象。植株發生病蟲害或生理障害時，易開不適期的花。此類花不但不發育，反易消耗株內養分，必須摘除。

（二）腐爛病株，患部上側可根接酸柑或廣東檸檬一年生幼苗，以促進恢復樹勢。根接時應植根砧苗與先種根砧苗待成活後根接，二法之比較，以前者操作較方便，兩者間根接成活率無明顯差異。

根接時期應以一月下旬至二月中旬為適宜，但有灌水設備之處，週年均可舉行。

（三）選擇接穗較粗凸出處，用根接刀或芽接刀切深達木質部長約一英寸「凹」形口，將根砧斜切面插入，兩者形成癒着後縛紮或釘上銅釘固定之。根接部覆土後每天要灌水，防止根接部之枯乾，並促進根砧苗之發根。（翁仁敏）

蕉香

仙人蕉價值高 矮脚蕉能抗風


〔問〕：（一）本省現時所栽植的香蕉有幾種？（二）瑞芳鎮侯洞站之山坡地，栽植何種香蕉為宜？（三）南投縣名間鄉一帶是種何種香蕉？

〔答〕：（一）本省現時所栽植的香蕉有幾種？

新 春耕請用

竹下耕耘機

機器可靠 另件充足



竹下農機公司

四谷稻米國蕉又稱粉蕉此是何種？
〔答〕：（一）本省現有栽培香蕉品種有仙人蕉、北蕉及矮脚蕉等。

（二）仙人蕉因其產量高、外觀美、果肉甜、香味濃、品種好且較抗萎縮病，具有經濟栽培價值，但有強風感可種植矮脚蕉，較能抗風。

（三）名間鄉一帶仍以仙人蕉為最普遍，雖亦有矮脚蕉之種植，但栽培面積尚小。

（四）粉蕉又名低脚類芭蕉（矮脚蕉），原產我國，現為我國香蕉栽培重要品種。植株高度僅一·五公尺左右。因為矮小，能抗強風，但產量低，又不耐貯藏，本省栽培不多。將來如選擇優良系統與改善包裝運輸，可能適宜於臺灣栽培，以減少颱風之災害。

（五）所謂四、五合尺就開花結果，可能即指右記品種矮脚蕉。（翁仁敏）

北部種香蕉經濟價值低

〔問〕：（一）北部能否種植香蕉？收穫量如何？（二）北部何時下種最好？

〔答〕：（一）香蕉品種有幾種？何者較佳且適於北部氣候？

（二）關於種植有何資料可參考？

（三）番石榴何種為佳？苗木何處購買？

（四）番石榴何種為佳？苗木何處購買？

※新到貨※

蘆筍種子

- 美國 BUREBA 公司原封罐裝
- 美國 DASSERT 公司原封罐裝
- 美國華盛頓五〇〇九號蘆筍子
- 美國加州五〇〇號蘆筍子
- 美國華盛頓蘆筍苗每株以上每株三角購多數者價格另議
- 日本夕夕一種苗株式會社
- 日本岡交配初秋甘藍
- 日本夕夕力種苗株式會社
- 坂田交配濱綠包心白菜

榮華種子行

臺灣總經銷處
三重市重新路一段72號
電話：九七二七四九號
郵政劃撥儲金一三五七一號