

(內番石榴品種，依用途可分為加工用及生食用兩種。生食用番石榴苗木，請函詢彰化縣永靖鄉五福村新高苗圃。加工用番石榴苗木，請函詢宜蘭縣政府建設局黃泮沂先生(翁仁盛)。

蔬 菜

滾綠包心白菜

適合立春後播種

【問】：(一)「滾綠」與「滾光」白菜，在本地立春後播種，那一種較好？如徹底防治病害，其生產是否安定？

(二)「滾綠」與「滾光」白菜比較何者產量較高？有其他適於春作之更優品種嗎？

(三)番茄之促成栽培與抑制栽培，其意義何在？以何種環境(氣候或市場)下，可探促成栽培或抑制栽培有利？

(四)「番茄大王」的日名叫什麼？何處有售？(苗栗鎮玉清里一四五號徐福安)

【答】：(一)在實地立春後播種請採用「滾綠」較宜，其生產除特別有寒流侵襲(在生育初期)外，其生產甚為安定。

(二)產量以「滾光」較「滾綠」高，但滾光之耐暑性較差，並忌下雨(在結球期)。以目下之品種，仍以栽培滾綠為宜。

(三)促成栽培或抑制栽培均為提高單位面積之收入為目的，兩者均有利，難以論定兩者之優劣。

(四)「番茄大王」係本省製造之植物荷爾蒙劑，故無日名，是東昇農產實驗所出品，請向樹林鎮農會推廣股轉達洽購。(王進生)

洋菇塊菌病

消石灰處理

【問】：我種洋菇干坪，現在正盛產期，但每經澆水一次就發生十數處之塊菌病，現在被害面積已達百餘坪，如此傳播勢必全部作廢，請問該病如何遏止，以免繼續擴大。曾使用「福爾麻林」消毒無效，請問如何防治？(鳳山鎮五甲路六一之四號林秋榮)

【答】：凡有發生塊菌病之菇床，應早日挖溝，使發生區之堆肥與無病區堆肥分開

草 牧

種植大芻草

八十天可青割

【問】：貴刊曾載大芻草下種八十天可採收，但我種的超過一百五十天以上，是何種原因？目前我已採收四公斤種子，但近一半為不充實變白色，這些充實的種子要如何處理？(彰化二林鎮外所里武山巷四一號蔡正盛)

【答】：(一)大芻草種下後八十天即可青刈餵牛，來信所說一百五十天係指不肯刈專供採種用的，不然，絕對不需要這樣久，草高三英尺以上即可青刈，如肥料水分充足，刈後二十五至三十天可再刈一次。

(二)種子可請寄臺中縣新社鄉南繁殖場，可依每公升十八元價格收購。(黃嘉)

卉 花

蝴蝶蘭簡易繁殖法

【問】：蝴蝶蘭須要施甚麼肥料？培植台上長青苔，有無妨礙？若有應如何去除？開花期間如何管理？何時繁殖？如何繁殖？(高雄市左營區合翠新村一三四號張)

【答】：(一)通常蝴蝶蘭皆用尿素稀釋一千倍，每半月用噴壺噴施一次，甚有效果，且不會因施用化學肥料侵蝕蘭根之慮，唯易引起培植板長青苔，頗不雅觀，但無害於蘭花生長，倘能使通風及日照良好可避免其發生。或用水浸魚骨粉之稀釋液施用，亦有效，且板上不致生長青苔，開花期間須要適當的光線、濕度及溫度，可延長花期。

(二)繁殖法有二種，一為有性繁殖法，所需設備較多，且手續繁複，在此從略。另一為無性繁殖法，其適期除每年之嚴寒季節外，任何時期均可行之。但最適時期為春季新根發生前及花謝之後。倘於夏季行之，切口處應用過錳酸鉀或硫酸尼古丁稀釋液予以浸洗消毒。此法為切根法，即將適度伸長之根

享譽已久 公認的效力

福利來



新貨已到 即請購用




鷄白痢特效藥「福利來」為供應新雞育成的成功特別實行八折大優待。

每罐一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

總代理：英商卜內門化學工業有限公司
 臺北市中正路一八〇〇號
 經銷處：國際家畜藥物廠
 臺北市長安東路一段三九號

各地均售

永興牌 柴機發動機



最信用，最可靠，最標準
 外銷國產品，臺灣省合作金庫及臺糖公司特地推薦，合約採用可獲分期付款。(北部顧客請連絡臺北營業處)

專門製造 發動機 抽水機

3吋	4吋	5吋	6吋	8吋
3—4馬馬	4—6馬馬	6—8馬馬	8—10.5馬馬	13—15馬馬
保證效果 省油耐用 物美價廉				

※中日技術合作，嚴格品質管制，榮譽出品。
 ※中央標準局註冊商標，申請核備在案。
 ※臺灣省檢驗局，性能檢驗報告確到國際標準。

永興機造股份有限公司
 總公司：嘉義市仁愛路111號 (TEL 2171)
 臺北營業處：臺北市西安路326號 (TEL 53371)