


豐年牌農藥

◆水稻，果樹，蔬菜，病蟲害之防治



興農化工股份有限公司

臺中縣大肚鄉中和村中山路十之六號

電話烏日局一〇六號

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保 | 馬 | 殺 | 樂 | 農 | 蘆 | 特 | |
| 必 | 拉 | 蟲 | 農 | 家 | 筍 | 快 | |
| 安 | 松 | 淨 | 家 | 福 | 福 | 殺 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 賽 | 富 | 除 | 甲 | 强 | (保 | 微 | |
| | 速 | 蟲 | 基 | 力 | 豐 | 量 | |
| | | 菊 | 巴 | 保 | 收) | 元 | |
| | | | 拉 | 必 | | 素 | |
| | | | 松 | 安 | | | |
| 文 | 靈 | 菊 | | | | | |



豐年牌

介紹優良鐘麻品種： 培格七號

季景元 · 劉興潮 · 屈先澤

鐘麻較為耐旱，對於土壤的適應性較廣，產量也高，因此，在許多不宜於栽培黃麻的地區，鐘麻是一種良好的代用作物。尤以民國四十六年，臺南棉麻試驗分所自美國佛州培爾格來特農事試驗場引進「BG-52」七一新品種後，單位面積產量顯著的提高，於是栽培面積大量增加，五十二年會達二千五百公頃，尤其是雲林縣的元長、土庫一帶，栽培特多。為了使農友們對它有更清楚的認識，現在把「培格七號」

的特性和栽培要點，作一個簡單的介紹：

一般性狀

- (1) 葉形：圓葉。
- (2) 莖色：綠色。
- (3) 腋芽發生程度：短且少。
- (4) 開花期：十月中下旬。
- (5) 纖維收穫期：播種後一百三十天以上，或至始花期收穫。
- (6) 種子採收期：開花後五十天。
- (7) 採種量：每公頃平均採種六百至九百公斤。

特性

- (1) 抗病性：對炭疽病不易感染。
- (2) 抗風性：強，不易倒伏。
- (3) 精洗率：皮層厚，精洗率在十

栽培要點

二〇以上，四十九年及五十年區域試驗結果，每公頃精洗麻產量，平均為二、五六七·九公斤，最高達到三、六五七·三公斤。

(1) 選擇適當土地：宜選表土深厚，排水良好，線蟲病不嚴重的砂質壤土栽培，或在排水良好，土質輕鬆的第二期單期作水稻田種植。

(1) 播種適當時期：採織用者，宜在三月至五月上旬，四月上中旬最為適當。採種用者，宜在六月下旬至七月上旬。

(3) 肥料用量：每公頃施

(寄澤先展) 範示號七格培麻鐘



黃麻插頭苗打插紫蘆(鮑國琛攝)

用堆肥一萬六千至二萬公斤，作為基肥，硫酸銨四百至六百公斤或尿素二百至三百公斤，過磷酸鈣一百一十至二百二十公斤，氯化鉀一百六十至二百四十公斤作為追肥，分三次施用；第一次於播種後二至三星期，在行側開淺溝施入並覆土，以免肥料流失；第二次在播種後四至五星期，施用於另一行側後，兼行培土，土高約十至十五公分；第三次在七至八星期施用。

(4) 適當栽培密度：以行距四十五至五十公分，開播種溝條播，每公頃

播種子十五公斤(二畝斗半)。種子發芽後一個月，間苗二次，按六至九公分株距，行鼎足形定苗，每公尺要保持麻苗十五株。

(5) 誘殺葉螟：麻田四週種植玉米一行，在五月中旬至六月上旬，拔去燒燬，並將靠近玉米五行的鐘麻，噴灑八百倍「安特靈」乳劑。

(6) 收穫調裝：鐘麻葉柄上有刺，應先去葉後剝皮。剝皮時以從根部向上剝取較易，然後將鮮皮浸水精練，製成精洗麻，浸水時間較黃麻為短。

藥 農 牌 豐 正

◆ 蔬菜·水稻·果樹·雜糧蟲病防治 ◆

- 可美農乳劑
- 永利農乳劑
- 機械油(夏油)
- 美果素乳劑
- 拜耳多乳劑
- 無敵松乳劑
- 可樂收乳劑
- 利必乳劑
- 特殺松乳劑
- 能敵師乳劑
- 美粒松乳劑
- 寶利多乳劑
- 新滅菌液劑



誠實服務
信用最好
效能最強

正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峯 電話六三號