



黃麻梢頭苗扦插繁殖（範國琛攝）

用堆肥一萬六千至二萬公斤，作為基肥，硫酸銨四百至六百公斤或尿素二百至三百公斤，過磷酸鈣一百一十至二百二十公斤，氯化鉀一百六十至二百四十公斤作為追肥，分三次施用；第一次於播種後二至三星期，在行側開淺溝施入並覆土，以免肥料流失；第二次在播種後四至五星期，施用於另一行側後，兼行培土，土高約十五公分；第三次在七至八星期施用。

(4) 適當栽培密度：以行距四十五至五十公分，開播種溝條播，每公頃播種子十五公斤（二臺斗半）。種子發芽後一個月，間苗二次，按六至九公分株距，行鼎足形定苗，每公尺要保持麻苗十五株。

(5) 誘殺粟螟：麻田四週種植玉米一行，在五月中旬至六月上旬，拔去燒燬，並將靠近玉米五行的鐘麻，噴灑八百倍「安特靈」乳劑。

(6) 收穫調裝：鐘麻葉柄上有刺，應先去葉後剝皮。剝皮時以從根部向上剝取較易，然後將鮮皮浸水精練，製成精洗麻，浸水時間較黃麻為短。



## ◆蔬菜·水稻·果樹·雜糧蟲病防治◆



誠實服務  
信用最好  
效能最強

可美農乳劑 · 機械油(夏油) · 永利農乳劑 · 美果素乳劑 · 拜耳多乳劑 · 無敵松乳劑 · 可樂收乳劑 · 利必乳劑 · 能敵師乳劑 · 特殺松乳劑 · 美粒松乳劑 · 寶利多乳劑 · 新滅菌液劑

正豐化學股份有限公司  
臺中縣霧峯

電話六三號