

插秧後第一期五至七天，第二期三至五天，本田內部份雜草的第一葉發現時，田面保持三公分積水，均勻撒布藥劑於田面。施藥後田面繼續保持三公分水保達三天以上。本藥劑殺草能力好，水稻不受藥害，是一種理想的本田除草劑。除施藥前已成長的雜草不易殺死，應在整地時盡量除去，又對三角草殺草效能較差外，對於水田大部份雜草效果都很好。施用本劑一次後，不需要再做人除草。

積水太深的水田，或秧苗軟弱的稻田，應盡量避免使用本劑，以免發生藥害。本藥劑不易溶解於水。應均勻撒佈於田面。稻株潮濕時，撒佈本藥劑將發生藥害，應待稻株乾後撒佈。

**五〇%加農一三三可濕性粉劑**

淡赤黃色的可濕性粉，施用於土壤後阻止雜草的發芽和生育，殺死雜草種子和剛發芽的雜草。對於一般水田雜草具有強力的殺草效果，藥效不受溫度高低影響，但施用於透水性過大的水田，容易發生藥害。每公頃用二公升「加農一三三」加水四百五十倍，水稻插秧後一期作五至七天，二期作三至

五天，田面保持三公分水，均勻撒佈藥液於田面。施藥後積水二至三天。施用前的準備工作與「多谷」一樣。施用量不宜太多，否則容易發生藥害。藥液應多攪拌，使充分溶解，並應均勻撒佈。砂土或漏水田不要使用。使用器具在工作前後應洗滌乾淨。藥劑應密封後放入罐內，避免與種子、飼料或其他農藥放在一起。

**早作除草劑**

**二五%多谷乳劑**

暗褐色的液體，為土壤處理劑，雜草發生前使用時效果最好，有部份接觸殺草的效果，目前推廣於胡蘿蔔，花生及玉米等旱地作物的雜草防治。

前述三作物，播種覆土後輕輕鎮壓床面即可施用藥劑。每公頃施用六至八公升「多谷」乳劑加水一百五十至二百倍，均勻噴灑於畦表面。粘黃土壤用八公升，較乾土壤應多加水。本藥劑施用後藥效能持續一個月，在此期間內應避免中耕、培土等搖動土表的工作。施藥後，作物所發的幼芽，子葉上

偶會有斑點，但在短期內即可回復，不致影響產量。如田間已有雜草，應行一次人工除草後再施用本藥劑始有效果。本藥劑在播種後表土還濕潤時施用效果最好。在夏季連日下雨時不宜使用，用具在使用前後應用清水洗乾淨。

**八六% P C P 可濕性粉劑**

灰白色的水溶性粗粉末，播種後施用於表土時，可殺死任何種類的雜草種子，並抑制發芽。發芽後的幼小雜草，接觸本劑亦必枯死。目前本省推廣於苗栗以北的花生、大豆、玉米和高粱等旱田作物。藥效可持續約二週。

上述四種作物，播種、覆土及鎮壓後可施用本藥劑，每公頃使用本劑十二至十五公升，過乾土壤應多加水，宿根性雜草或播種時已有較大雜草，應在整地時澈底根除，作物播種後覆土的厚度為二至三公分。本劑對魚貝類毒性較大，應防止藥液流入河川，以免為害魚貝類。

因為毒性大，撒佈應力求均勻，避免重複撒佈，如附着於人體皮膚時，應以肥皂水洗滌乾淨，用具在使用前後亦應洗刷乾淨。


**請用安全可靠的水田除草劑**

**多谷粒劑**

TOK Granular (農藥登記證第665號)

- ◎植物保護審議會，農林廳推廣水田用除草劑。
- ◎每甲地用藥量30公斤，插秧後五至七天用手均勻撒佈即可，施藥後請保持田面水深三公分三天，以後缺水亦不影響其殺草效果。
- ◎可與肥料、粉劑或粒劑農藥混合使用。
- ◎施用多谷粒劑後，完全不必再行人工除草。
- ◎對水稻不會發生藥害，對人畜、魚介類無害，可安全使用。

**真方便！  
真有效！**



說明書函索即寄

現貨供應處：臺中縣霧峰鄉草湖路二號 (電話 03 號)  
**正豐化學股份有限公司**  
 臺灣總代理：臺北市郵政信箱第1643號 (電話 36177 號)  
**青象貿易有限公司**

標商記登司公斯哈門羅國美\*