

農友經驗



草菇堆肥改良糊仔甘諸

現在一般人都用稻草栽植草菇，待草菇收穫後稻草都廢棄不用，或不知如何使用，實在可惜，屬不知這些栽植草菇的稻草肥份成分很高。

用第一期稻草種草菇，收穫後利用這些草和堆肥摻和，施放在間作的糊仔甘諸上，可使塊根碩大，增加產量。

甘諸苗最好是截取第一段或第二段，種下後十天略施肥料，待苗長後，應摘心使它長出更多的苗枝。到稻谷將收割時，二次施肥後再放草菇。而割稻後，將碎土聚成田壠時，根部就有足夠空隙及疏鬆泥土，故可以長成很大塊根。(彰化縣埔心鄉油車村三八號坐仁和)

我如何種花豆

現在人口不斷的增加，但耕地有限，所以必須盡量利用耕地，我曾在糊仔甘諸畦邊種花豆(敏豆)，這種作物是省本又省工的栽培，現在簡介如下：

(一)在

糊仔甘諸第一次做好畦時就將花豆種子種入畦



友農杰炳陳

損失。

素肥料，應施在花豆播種約三分處，用土掩蓋肥料，以免肥料受日晒而損失。

(二)在豆莢有帶黃色時就可以收成，倘要做種子用時，須等豆莢乾才能採收，種子必須曬乾才能貯藏。

(三)貯藏法是將種子曬乾後，用缸底必須先放約十公分厚的粗糠，然後再放種子，上面亦必須再掩蓋十公分厚的粗糠及溪砂，溪砂亦蓋十公分厚，粗糠及溪砂必須晒乾才能掩蓋種子，以免種子受害。(雲林縣大埤鄉南和村尼姑庵二號陳炳杰)

薄荷宿根栽培的經驗

以前薄荷要宿根栽培時，大家都是在收割後隔日施肥，但因受太陽所晒，所以肥份容易流失，發芽甚不整齊，影響二期薄荷的發育，致使生產的油量大為減少。


現在我改在收割前施肥，如此較可以保持肥份，且發芽平均，最後可增收薄荷油三十%左右。

在收割前日施肥後，恐肥料停留在葉面，因此我用木麻黃枝葉，輕輕在葉面上左右移動使肥料降落地面。

以上是我對薄荷宿根栽培的經驗，請各位農友試試看。(嘉義縣布袋鎮過溝西勢四十一號王金已)

97-15

欲增加收穫
先從土壤消毒！
西瓜蔓割病等
土壤病害之特效藥



新土壤殺菌劑<農藥字第237號>

シニルトン

施美農

100cc-500cc

西瓜、胡瓜、番茄等蔬菜以及菸草、鐘麻等之農作物為種々土壤病害所侵襲、而受到莫大之損害、以前要防除這種損害、却苦無適當之農藥、現在日本三共已製造出新的土壤殺菌劑<施美農>。效用卓著可以安心了。

- <施美農> 為最新型土壤殺菌用水銀劑、灌法土中該藥能逐漸滲透土壤。
- 在土中其接觸殺菌力及蒸氣殺菌力非常優良、故其對土壤病害之消除有確實之效果！
- 因其藥害很少、如適當應用、並可用於生育期間之農作物。

總經銷處 裕隆商行
台中市建國路 167號

日本・東京
三共株式會社
台灣總代理
中國化學製藥股份有限公司

