

農業信箱



永樂街七三號林光烈

【答】：(一)七月種植香蕉，至目前所發出的吸芽均需除去，以免影響大株發育。

(二)依你種植時期及香蕉發育情形看來，最好於二、四月間留芽為宜，每株僅留一個健壯芽即可。

(王兆全)

樹果

廣東檸檬砧木

青心紅心兩種

【問】：(一)我擬種植廣東檸檬砧木嫁接柳橙，未知嫁接後將來果實之甜度是否會變質？

(二)廣東檸檬砧木之砧樹，其壽命及生育情形如何？

(三)廣東檸檬之品種據說有紅心及青心二種，那一種是紅心，那一種是青心，要選何種較好？(兩校縣水裏鄉北埔村民旋街四七號陳清泉)

【答】：(一)廣東檸檬砧木印仔柑與酸柑砧印仔柑，兩者比較，在果實甜度上並無顯著差異。

(二)廣東檸檬砧木印仔柑幼株生長較酸柑砧者為迅速，但結果株生長，以後者為旺盛。

(三)廣東檸檬以新芽之顏色不同(紫色與青色)，可分紅心及青心兩種，本省一般採用之廣東檸檬以紅心者較多。由廣東檸檬砧之廣泛使用，歷史尚淺，有關壽命問題尚不詳。(翁仁祿)

七月栽植的香蕉

二至四月可留芽

【問】：(一)我在南投縣山坡地七月初栽植香蕉，現在發育很好，但各株均發生大小吸芽數芽，據說中部地區留芽最好是十二月出土的吸芽，若如此，則十二月以前的吸芽是否全部除去？

(二)以我的香蕉情形來說，要留何時出土的吸芽最好？每株留幾芽？(彰化市中華里)

菜蔬

山地栽培辣椒

連續採收二年

【問】：辣椒是否適宜山地種植？種植期何時？如何栽培、管理及施肥，生產期有多久？(臺中市三民路三段三五七巷七號陳盛儀)

【答】：(一)辣椒適合山地種植，土地以未曾種過茄科植物的為上選。一般向陽排水良好，且含有機質較多的土壤最宜。

(二)播種期以三、四月為宜，每十公畝之播種量三十七、五公克，育苗期三十一、三十五天，行距六十一、七十公分，株距四十五、五十公分，本圃之肥料每十公畝約堆肥二千四百一十三公斤，豬糞尿二千公斤，尿素三十公斤，過磷酸鈣四十一、五十公斤，氯化鉀三十公斤。

(三)定植後至採收約需七十天，採收期約八、十二個月，如管理良好能採收二年。(王進生)

冷凍外銷豌豆莢

多為在來白花生

【問】：(一)冷凍外銷豌豆莢以「臺中九號」與「在來白花生」兩種那種產量高？生育期長？

(二)製罐「百富」與「罐王」豌豆，那種產量高，生育期長？

(三)豌豆莢及加工豌豆，何處有可靠種子出售？

【答】：(一)今年是否繼續辦理冷凍外銷。(彰化埤頭鄉美利村美利路八一之一號黃陸發)



農藥登記證第三八二號

好速殺 50% 水和性粉劑
含毒撲丹 50%

ORTHOCIDE 50% WETTABLE (50% CAPTAN)

● 最新農用殺菌劑 ●

使用便 毒性低 效果好 收益多

● 優點

- ① 控制病害
- ② 增加產量
- ③ 改良果實色澤
- ④ 促進果實肥壯
- ⑤ 保持優良品質
- ⑥ 溫和不傷植物
- ⑦ 混和性
- ⑧ 毒性低

● 適用病害

- ① 一般性撒佈：
果樹、蔬菜、花卉、麥類
- ② 土壤病害：
蓮藕、蔬菜(葱、菠菜、菜)
水稻、落茄



製造廠 Chevron Chemical Company
ORTHOCIDE Division U. S. A.

經銷處 泰洋股份有限公司 臺北市重慶北路2段108號 電話：44994
東益貿易公司 臺北市南京西路26號2樓 電話：43802
正豐化學公司 臺中縣霧峰鄉草湖路2號 電話：霧峰63
總代理 惠農股份有限公司 臺北市長安東路2段16號 電話：52093