【答】：㈠冷凍外銷豌豆莢以「在來白花」種較宜，因冷凍加工後豆莢無帶紫色素。兩品種除臺中九號較早生外，其產量略相同。

㈡「百富」及「蠟王」兩種之產量相差不多，但由地區不同各有差異，在貴地尚無試作，故不敢斷定其優劣，生育期亦略同，在製罐方面有人偏愛「蠟王」。

㈢爽豌豆請採用「白花軟莢」，臺中市種子行均有出售其種子，九以和美鎮爲多。加工豌豆「百富」種，宜向大甲鎮農會李股長永謙洽購爲宜。

㈣今年仍繼續辦理軟莢豌豆加工，宜與鳳山鎮綠球冷凍食品工廠或金山農場接洽。（王進生）

水稻

水稻穗肥施用適期

【問】：臺中一七八號、嘉農二四二號、臺中在來一號等，一期作與二期作，插秧後幾天施穗肥與粒肥最適合，施肥量多少爲宜？（彰化二林鄉西庄里　泉西巷三八號陳春光）

【答】：所問穗肥與粒肥之施用適期如下：

一期作：臺中一七八號爲五十五天，在來一號爲六十五天，嘉農二四二號爲六十五天；二期作：臺中一七八號爲四十二天，在來一號爲四十七天，嘉農二四二號爲四十五天，（以上均爲插秧後日數）。施肥量用氮肥每十畝二公斤爲準，可按水稻之養分多寡，即葉色之濃淡增減之。（林克明）

臺北「三〇九」「三一〇」水稻品種主要特性

【問】：㈠據貴刊十四卷二十四期刊載「臺北三〇八號」自插秧至收穫日數，一期作九十天，二期作七十七天確否？又該品種對葉稻熱病與穗頸稻瘟病的抗病程度各如何？

㈡臺北「三〇九」、「三一〇」兩品種之葉稻熱病與穗頸稻熱病的抗病性、分蘖情形、倒伏性、自插秧至收穫日數等，一、二期作各如何？

㈢在新竹區農改場舉行之區域試驗中，臺北三〇九號表現（指產量順位）怎樣？

㈣上記稻種有何特別注意事項？（苗栗鎮玉清里一四五徐輝安）

【答】：㈠臺北三〇八號水稻之生育日數第一期作爲一百十五天，第二期作爲一百零八天，故本刊十四卷二十四期刊載之日數，諒系自插秧至抽穗齊之日數，葉稻熱病中感，穗頸稻熱病亦爲中感。

㈡臺北三〇九號及臺北三一〇號之特性如左：

品種	分蘖穗數	倒伏性	生育日數	葉稻熱病	穗頸稻熱病
臺北三〇九號	一五・二	斜	一期作一二五天 二期作一〇六天	抗	極抗
臺北三一〇號	一四・四	直	一期作 二期作 八八天	中感	極感

㈢臺北三〇九號在新竹區試驗之成績，第一期產量指數一〇二・四，第二期產量指數九五・二。

㈣單位面積之三要素施用量與臺中六五號略同，不可增加氮素之施用。（王進生）

病蟲害

害蟲名稱形態參考昆蟲書籍

【問】：㈠貴刊十五卷十一期廿頁的「認識蔬菜害蟲」，對農友們有不少幫助，深爲感謝，希望再詳細刊載其時徵及英、日、臺語等名稱。

㈡擬尺蠖的成蟲形態如何？其英、日及臺語叫什麼？

㈢紋白蝶的成蟲形態如何？其英、日、臺語叫什麼？

㈣以上蔬類的防治法如何？

㈤指導員手册，〇二三植保〇四第十七頁（農林廳編印）中之「瓜化苦」與「涙化甲烷」等，二種藥品的日本名是什麼？（大甲鎮孔雀路一〇六號張蔣明）

【答】：㈠蔬菜害蟲的特徵最好能參考「臺灣主要作物病蟲害彩色圖說」（農林廳編印，植物保護學會代售），或臺大昆蟲系

●●●●● 好消息

小型輕便除草，碎土機●●●●

中洲牌除草機一臺，每年可節省數萬元工資。用途很廣，如，香蕉、茶、葡萄、柑橘、鳳梨、花及各種果樹園除草用。並可作爲小型碎土機實爲農業界福音。



明細

①身長：3臺尺
②身高：2臺尺
③體重：80臺斤
④馬力：2馬—3馬
⑤每加倫：6—7小時

碎土情形：深淺可調整最深到6臺寸，刀片可依情形調節最寬1尺5寸最小4臺寸。

除草情形：草連根同時除去，每小時大約1分6厘地。

現貨供應　每臺售價柒仟伍佰元正

中洲行：臺中市復興路三段503號（臺中菸酒公賣局對面）

腸胃蟲及肺線蟲的驅除新藥

Promintic Inj

「波羅命的」針劑



優　點

●注射用法：藥劑不能被畜類嘔出。
●效能廣汎：保證幾乎完全驅除腸胃蟲及肺蟲。
●效力宏大：一劑能驅除成蟲及未成長全部
●好敏捷：迅速止因腸胃蟲之瀉痢並鎮平肺蟲之呼吸障碍。
●藥性温和：嚴重病畜幼小家畜均可施治。
●不污染羊毛・●排蟲快速・

總代理：英商卜內門化學工業有限公司
臺北市中正路1800號

經銷處：國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號