

主任易希陶編著之「經濟昆蟲學」，或中興大學前昆蟲系主任黃毅卿編著之「昆蟲學」。

〔二〕擬尺蠖有多種，其中常見為害蔬菜的有銀紋夜蛾與金紋夜蛾兩種，日名稱前者「タマナキンウハバ」，後者稱「キクキンウハバ」，其幼蟲中文統稱擬尺蠖。臺灣話一般稱「尺蠖」、「弓背蟲」，或「番龜蟲」。英名稱「Cabbage looper」或「inchworm」。成蟲形態請參看本刊第十三卷廿四期十三頁。

〔三〕紋白蝶或稱白粉蝶或黑點粉蝶，其形態請參考右列「經濟昆蟲學」或「昆蟲學」。其英名稱「Cabbage worm」或「white cabbage butterfly」，日名稱「モンロチョウ」，幼蟲稱「アラムシ」，臺灣稱「青蟲」。四防治方法請參考本刊上期蔬菜害蟲防治推廣方法。

〔四〕氯化苦日名稱「クロルピクリ」(Chloropicrin)，溴化甲烷日名稱「メチルブライド」(Methyl bromide)。多用於倉庫、土壤及種葡之煙葉消毒，對人畜有毒應注意。(張良傳)

加工

本省食品加工

前途很有希望

〔問〕：閩貴刊第十五卷十九期「臺灣食品加工業外銷前途大可發展」，一則至為嚮往，但因職業的關係，未敢一試。今欣獲貴刊刊載此項消息，故特修函請教，請惠示臺灣目前食品加工實況，與尚可一試而有前途之食品加工，及有關加工技術參考書籍為盼。又食品加工為農業之一類，如貴刊能增刊刊載，即獲益非淺。(高雄市中山三路一〇〇號之林耀英)

〔答〕：(一)有關食品加工參考書，可向臺北市衡陽街「台隆書局」，或高雄市中大馬路「大新百貨公司書籍部」查詢購入。

(二)本省因產物豐富，工資低廉，對食品工業前途至為有望。目前如洋菇、鳳梨、蘆筍及柑桔罐頭之外銷，鳳梨、香蕉、木瓜以及蔬菜之脫水加工，農產水產之冷凍加工，

各種果實蜜餞加工品之外銷，和蔬菜醃漬品等，外銷量均年年增加。相信能擴大打開銷路的話，均得製造營利。(朱仙和)

製造果汁參考書

〔問〕：由果汁機榨出之果汁，要使其澄清(原汁基濃)，是否要用開水稀薄，並混入何種藥料？又如要長期保存時，要用對身體無害之防腐劑及其用法用量如何！(南投縣竹山鎮竹山里前山路橫巷一三一號劉高顯)

〔答〕：有關果汁澄清劑，防腐劑及詳細製造技術問題可參考日本昭和廿七年出版「果汁技術研究會編之「果汁ハンドブック」一書，有詳細說明，該書可向臺北市衡陽路七九號台隆書局洽購。(朱仙和)

防止麻竹風害

〔問〕：海拔八百公尺山地種麻竹，因土地肥沃，母竹高大，擬在一丈五尺高處，將母竹尾節部砍去以防風害，請問這樣是否會影響竹筍產量？(苗栗南庄鄉東河村一四號古阿青)

〔答〕：(一)麻竹在優良之生育環境下，可能生長高大，如果為避免颶風吹折，可砍除竹尾，保留竹桿，高度六、七公尺，同時在竹叢周圍施行中耕、蓋草或培土，應該不致影響竹筍產量。

(二)如果在每年留母竹時，在白露前後，選取竹筍直徑較小者保留為母竹，就不致發育過份高大，但其發生的新筍仍然肥大，不過應配合採用集約栽培。

(三)有關麻竹集約栽培及留母竹等問題，請參考本刊第十五卷第十七期「麻竹集約栽培」。(江壽)

林竹


砍短母竹尾節

桂竹採伐時期

七至二月最宜

〔問〕：(一)桂竹開伐以何時為宜？(只留一、二年生竹)。

(二)應如何管理才能提高生產量？(嘉義梅山鄉太平村坪路一號陳濟)



民豐牌農藥

竭誠的為您服務

民豐

巴拉松乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
福斯靈乳劑
米多收乳劑
蟲敵乳劑
速滅螟乳劑
必賜多乳劑
民豐松乳劑
強克安乳劑

民豐化工廠股份有限公司 臺中縣大里鄉內新路59號 電話：5087 · 5088