

！好益栗板培栽

仁懿願

板栗適宜在本省海拔五百至一千二百公尺，略為乾燥的地帶生長，為適應市場的需要，並避免外溢的損失，我們應積極提倡板栗栽培。

我國板栗學名為 *Castanea Mollissima Blume*，屬殼斗科，在大陸上為普遍栽植的樹種，東自海濱諸省，西至川康，北自遼寧，南至閩粵，均有栽培成林者，或野生者，在偏僻處有為森林主木者。我國華北一帶，栽植食用板栗甚為普遍。昔日太史公有「燕秦千樹栗，其人與千戶侯等」，可見栽培板栗必獲利甚厚。

主要品種有三

板栗種類很多，主要有密雲種、遷安種，及遼化種三類。密雲種皮色紅，種粒小，味甘，早熟。遷安種皮色黑有茸毛，味淡，種粒較大，晚熟。遼化種皮色黃具光澤，味較甘。所謂良鄉板栗，是在清代某年祭孔期，河北省良鄉縣無產品送祭，乃將密雲縣所產板栗代送，標明「良鄉板栗」，良鄉板栗大名鼎鼎以迄於今，而揚名海內外。

本省目前市面上所出售的板栗，

據說來自香港，品種不詳，但於日據時代曾自日本引進少數品種，栽植在本省中南部深山中，惜不為當地人民了解，或砍作薪柴，或棄置荒山，任其自生自滅，或點綴庭園，任孩童攀爬嬉戲。近年來，以板栗頗受重視，昔日已荒蕪的母樹已被更新，或已撫育，致兩年來市面有本省產板栗出現。

本省板栗品種為由日本引進，為 *Castanea crenata*，有兩種：一為大粒種、皮色紅、味淡、較晚熟；另一種為小粒種、皮色黑、味甘、成熟較早，一粒果實約有二至三粒種子。

播種移植栽培

板栗果實又稱殼斗，外被密刺，內藏種子一至三粒，成熟時刺端尖銳，手觸疼痛異常，所以採收種子時，須用檢拾法；即當種子成熟時，將母樹附近地面清理乾淨，以便果實落下時易於檢拾，果實成熟後果皮自然裂開，檢拾後輕敲果實，種子即脫落。板栗種子成熟期為八至九月，以其粒大，儲藏不易，無論用土圍或冷藏均易失去發芽力，如放置日久，種內水分又易被散失，所以種子必須隨採隨播於塑膠砂袋中，發芽後真葉生長三至四片越冬。一年生幼苗在臺灣冬季很少落葉。海拔高處越冬時，須加蓋蔭棚，免遭霜害，翌年秋季生長至一至二臺尺高度，即可擇地定植。定植前，須掘穴一公尺見方，內置腐熟堆肥，則定植後，不但生長迅

藥 農 牌 豐 正

◆ 蔬菜 · 水稻 · 果樹 · 雜糧 蟲病防治 ◆



誠實服務
信用最好
效能最強

- 可美農乳劑
- 永利農乳劑
- 機械油(夏油)
- 美果素乳劑
- 拜耳多乳劑
- 無敵松乳劑
- 可樂收乳劑
- 利必乳劑
- 特殺松乳劑
- 能敵師乳劑
- 美粒松乳劑
- 寶利多乳劑
- 新滅菌液劑

正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峯 電話六三號