

法治防的脫宮子猪母

■ 清 法 趙 ■

母猪爲什麼會發生子宮脫？答案是一般都因爲營養不良，體質衰弱、難產、或胎衣滯留等原因，都可阻止分娩後子宮的復原而引起子宮脫。此外，如三品種母猪，飼養太肥，運動不足，或子宮廣韌帶弛緩，也是引起本病的誘發原因。子宮脫出遭受細菌感染的，後果大都不好，即使經過整復後的手術，也易變成殘廢猪。

調整飼料

母猪發生子宮脫時，常爲二個子宮角同時脫出，有時在產後數小時以內，子宮全部反轉脫在陰門外。脫出子宮的血管常鬱血，呈暗赤色，經久時子宮粘膜乾燥，易擦傷流血，倘擦傷流血過多，常易發生死亡。

如能經常注意下列各項飼養管理，可以預防母猪子宮脫發生：

種母猪懷孕時期，須經常維持適當的營養和優良健康狀態，使它有適當的運動，以免母體過於肥胖。

保護母體，避免產生死胎，減少難產的機會。自分娩前一週起，漸減飼料餵量，等等到分娩當日減至平時餵量的一半，到達分娩後，漸增飼料至一週時，再恢復平時餵量。

飼槽和水槽應經常保持乾淨，免使飼料醱酵，飲水不潔，有碍胃腸消化。

注意待產母猪排糞和排尿狀態，早期發現便秘或臌脫，應設法補救。

分娩時間過久的，可使仔猪早期哺乳，促進母猪分娩和子宮收縮。

獸醫助產

母猪分娩時，管理人必須在旁守候處理，難產母猪速請獸醫助產。

分娩後經二、三小時，仍未見胎衣排出，亦須速請獸醫注射催生針，如腦下垂體後葉素 (Pituitary)，使胎衣排出。

雙槽式沼氣池

(續上期) 沼氣池建好後，可用魚池或陰溝污泥或自他人溢出池取用水肥一擔倒入，然後把兩個鐵蓋蓋好。即可放進糞尿。五天後開始產生氣體，但在十四天內所產生的氣體都不能點燃，應該放掉。

鍾博

如已發現母猪子宮脫，須立即請獸醫整復治療，以減損失。子宮脫治療法，局部可先用微溫食鹽水或消毒藥液洗滌清潔，然後再用百分之二至三明礬水灌注脫出的子宮黏膜面。如黏膜面有損傷時，可用碘酒塗布或縫合。倘脫出的子宮經明礬液收斂而收縮後，可由助手協助施行整復。如病狀惡化時，仍以淘汰出售處理爲妥。

合土灶使用十分方便。

材料明細表：

雙槽式沼氣池建造費用

材料	數量	單價	金額
水	十包	四五元	四百五十元
紅磚	一千五百塊	四角	六百元
小石	一牛車	七五元	七五元
大石	二牛車	卅五元	七十元
砂	三牛車	五十元	一百五十元
石棉管 (六尺長)	一支	十二元	十二元
六寸徑	二支	八元	十六元
鐵蓋 (五釐鐵板)	一個	八百元	八百元
四尺×四尺×四尺	一個	三百五十元	三百五十元
四尺×四尺×四尺	一個	三百五十元	三百五十元
四尺×八尺×七寸	一個	二元	二元
鐵鍊	十六尺	七角	卅二元
尼龍繩	二十尺	四元	卅二元
厚橡皮管 (四分徑)	七尺	四元	卅二元
塑膠管	四分之三寸徑四公尺	五元	二十元
四分徑	二十公尺	四·五元	九十元
簡便燃器 (鐵管鑄製)	一個	四十元	四十元
泥匠工資	六工	五十元	三百元
合計			三千零五十一元

