



# 農業信箱

(一) 依選擇優種立場，因未達結果植株之產量高低、品質等皆不知道，不宜採用，惟一般繁殖苗者，亦常由幼樹採取接穗，加快繁殖。  
(二) 為梨砧較大型砧為優，當可利用為梨砧根接改良或補救。(王兆全)

### 荔枝開花期 要充份施肥

(一) 荔枝的葉面施肥可否使用尿素，其方法如何？  
(二) 促進荔枝果實肥大與防止落果，用何種農藥，較有效果？(屏東春日鄉古華國校劉化之)

(一) 荔枝無作葉面施肥必要。  
(二) 促進荔枝果實肥大的最有效辦法，是在開花至果實成熟期間充分施肥。防止落果最有效果的辦法是防治果實蛀蟲，可在果實發育期間，每十天噴射資文一次。(張振雷)

## 病蟲害

### 作物病蟲害彩色圖說

將於三月五日前寄出

【問】：貴刊會刊登植物保護學會出售「臺灣主要作物病蟲害彩色圖說」，我於五四年十一月廿二日，利用郵劃撥北字一三一〇四號匯寄廿三元(連掛號費)，至今未收到，請代查是否未出版(嘉義義竹鄉新店村四五號葉清池)

【答】：(一)臺灣主要作物病蟲害彩色圖說一元月底已發售一部份，凡已訂購者將於三月五日前，可全部寄出。  
(二)此次所印冊數尚有少量餘額，欲購從速。(植物保護學會李本顯)

## 樹果

### 未結果不宜採接穗

#### 大型可用烏梨根接

【問】：(一)去年接果高接法失敗，擬今年再嫁接，是否仍可用去年的高接法？或採用新芽或新枝嫁接？  
(二)我種植美系檸檬果有一年半，發育中等，想採其穗高接本地檸檬果，此穗是否可靠？或買別人已結果母株的穗較好呢？

【答】：(一)不論在那種枝幹接木都可以，惟成活與否，在乎接木技術，使枝幹間形成層密合緊緊，並且接穗以堅實健壯等為首要。  
(二)大梨扦插苗的發育、病蟲害抵抗力以及結果均不如烏梨砧之大梨苗，如以烏梨根接成活後，再砍除大梨基部加以改善或補救，是否可以？(高雄縣大社鄉嘉誠村十號李朝祖)

### 山地果園肥料

#### 可向農會申請

【問】：農民耕作山地之果子園用肥料，農會是否可以申請？(士林鎮溪山里六二一二號邱紹華)

【答】：查農民耕作山地之果園所需肥料，得根據糧食局所訂「五十五年第一期雜作肥料分配要點」規定，逕向當地農會申請分配(詳見五十五年春字第四期省政府公報)。(糧食局)

### 蕉園間作木瓜

#### 互相影響生育

【問】：請問那家種苗園可買到蘇魯夏威夷九號木瓜種子？價格多少？新種植香蕉園可否間作木瓜？若可以，株行距須多少？(臺中大里鄉東湖村五〇號林進添)

【答】：蘇魯九號木瓜種子，可向鳳山鎮鳳松路七五巷一號黃秀櫻洽購。新植蕉園，如採用目前農家一般栽培法，所用株行距

**好速殺 50% 水和性粉劑**  
**合蓋撲丹 50%**

**ORTHOCIDE 50% WETTABLE (50% CAPTAN)**

**● 最新農用殺菌劑 ●**


**使用便 毒性低 效果好 收益多**

● 優點

- ① 控製病菌害量
- ② 增加果實產量
- ③ 改良果實色澤
- ④ 促進果實肥壯
- ⑤ 保持優良品質
- ⑥ 溫和性
- ⑦ 混合性
- ⑧ 低毒

● 適用病害

- ① 一般性撒佈：果樹、蔬菜、花卉、麥類
- ② 土壤病害：蓮藕、蔬菜(葱、菠菜) 水稻、蕃茄



製造廠 **Chevron Chemical Company**  
**ORTHO Division U. S. A.**

經銷處 **泰洋股份有限公司** 臺北市重慶北路2段108號 電話：44994  
**東益貿易公司** 臺北市南京西路26號2樓 電話：48802  
**正豐化學公司** 臺中縣霧峰鄉草湖路2號 電話：霧峰63  
總代理 **惠農股份有限公司** 臺北市長安東路2段16號 電話：52093