

的見常省本

# 病蟲生寄禽家

基永李

本文所說家禽寄生蟲病，包含家禽內、外寄生蟲病和原蟲病，但因篇幅關係，只論本省較常見的種類，簡要說明其傳染，為害和防治方法。

## 吸蟲類

### 腸管吸蟲類

寄生在雞的腸管，為扁平舌狀小型吸蟲，分佈於世界各地，種類很多，在臺灣常見者如下：

①外旋吸蟲 *Echinostoma revolutum*：蟲體 10~22×1.6~2.7mm，呈柳葉狀。寄生於雞、鴨和人、犬的直腸和盲腸，發育上需要兩種中間宿主。第一中間宿主為螺螄，第二中間宿主為同類的螺螄、蝌蚪和蚌等。本省的家鴨，有二〇%的寄生率，家鴨有七八%寄生率。

②小泉吸蟲 *Echinoparyphium koidzumii*：蟲體 4~5×0.8~1.2mm，呈長筒形，單寄生於雞鴨和人的盲腸和小腸，發育史與前者同。本省家鴨有一四%的寄生率。

③ *Notocotylus attenuatus*：蟲體 4~5×0.8~1.0mm，呈筒形。寄生於雞鴨的盲腸和直腸。發育上需要兩種中間宿主；第一中間宿主為螺螄，第二中間宿主為螺螄和鼠。本省家鴨有三〇%寄生率。

**傳染**：此等吸蟲類均須兩種中間宿主，尤其第二中間宿主大部份均係水棲之螺螄，雞鴨啄食有囊包幼蟲之此等螺螄而被感染。

**為害**：寄生蟲數少時不顯示任何症狀，寄生數多時則貧血，瘦削，小腸發生出血性腸炎，盲腸充滿乾酪樣物質，雞和鴨因此而斃死，尤其以鴨為甚。

**防治**：預防本病，應採用不生食第二中間宿主的螺螄，驅蟲可用麝香草酚，四氯化碳或四氯化乙炔等。即用四氯化碳或四氯化乙炔——二ml加三ml流動石蠟灌入即可。

## 輸卵管蛭(日本雞蛋吸蟲)

寄生在雞鴨的輸卵管內和泄殖腔內，*Prosthogonimus japonicum* 分佈於東亞各地，臺灣也很普遍。雞有七%，鴨有一八%的寄生率。活時為淡紅色，形扁薄而半透明。長 5~6mm、寬 1.6~2.3mm，前尖後寬。在雞蛋和鴨蛋中常可發現本蟲存在。

台糖公司榮譽出品



# 飼料

# 酵母粉

高蛋白質

維他命飼料

飼料酵母粉使用量：

雞 3%~5%  
鴨 5%~6%  
豬 6%~8%  
牛 7%~8%  
馬、羊、狗等

六大功效 節省飼料 預防疾病 促進生長  
增加生產 增加收益 縮短時間



總經理 糖福企業有限公司

臺北市中山北路二段一〇七號  
電話：五〇六三八·五三〇六三