

爲害：春季幼鷄

被害最著，常有多數被寄生而斃死。寄生數少時無症狀，嚴重者無精神、羽毛粗剛、下痢、瘦削、貧血或腸閉塞而斃死。本病在不飼鷄容易發生，外來種較本地種容易感染，症狀也嚴重。

防治：幼鷄應與

成鷄隔離，養在無病原地區。鷄舍和運動場的糞便應當清掃，使場地清潔乾燥，並使太陽光充分照射，減少蛔蟲卵病原。飼料中混有維他命A，動物性蛋白質或抗生素時，亦可減少本蟲的感染和爲害。

驅蟲藥：Phenothiazine (硫二苯胺) 每公斤體重 0.5gm 混與飼料內給與或頓服，硫酸於鹼 0.2ml 溶解於 150ml 之水混於煉餌餵給。四氯化乙烯 1~2ml 裝於膠囊內或混於 3ml 流動石鹼投與均有效。最近均認爲 Piperazine 每公斤體重 0.1~0.2gm 內服一次有特效，並無副作用。至於 P.N 片及 Helminock，因價高不經濟。


(二) 鷄盲腸蟲 Heterakis gallinae

鷄盲腸蟲寄生於鷄盲腸，廣佈世界各地，臺灣也很普遍，有四八%寄生率。7~13, 9, 10~15mm (圖二)。

傳染：蟲卵於夏季經一週成熟，鷄攝食後在胃內孵化，二十四小時後全部仔蟲可達盲腸，幼蟲暫時潛伏盲腸深部繼續發育，數天後回盲腸腔內發育，感染至成熟最短需三十天以上。

爲害：幼蟲潛入盲腸壁，使盲腸壁肥厚發生慢性卡他。少數寄生時無症狀，多數寄生時引起營養障礙。與黑頭病病原體 Histomonas meleagridis 混合感染時，因盲腸蟲受傷粘膜爲該原蟲最佳的侵入門戶，且該原蟲入盲腸中卵內而排出於外界時可維持很久的感染力及易通過鷄胃而感染發病，所以盲腸蟲和黑頭病傳播有密切關係。

防治：與鷄刺蟲症同。用硫二苯胺 (Phenothiazine) 每公斤體重 0.5gm 可得九五——一〇〇%的驅蟲效果。又四氯化乙 2ml 加五倍生理鹽水或松節油 0.1~0.2ml 混 5~10ml 棉質油或菜子油灌腸亦佳。Piperazine 每公斤體重 0.2gm 內服或灌腸均可。如要減少黑頭病爲害，必須從本蟲防治做起，才真正有效。



蟲條溝林：二圖

大信牌農藥

應各界農民備用，產品項目大量增加！

品質優良
成分準確
藥效迅速



水稻，蔬菜
豆類，果樹 等用

殺菌劑

- (紋枯病用) **威力新** 液劑
農藥登記證 802 號
- (稻熱病用) **美稻農** 乳劑
農藥登記證 436 號

殺蟲劑

- 殺可新特新青靈
- 全級 滅拉
- 實殺蟲松多松靈丹
- 乳劑 乳劑 乳劑 乳劑 乳劑 乳劑
- 農藥登記證 493 號
- 農藥登記證 494 號
- 農藥登記證 755 號
- 農藥登記證 281 號
- 農藥登記證 416 號
- 農藥登記證 415 號
- 農藥登記證 562 號
- 農藥登記證 501 號

大信農化工廠有限公司 台北市天水路十五號 TEL 44309 · 50945