

樹果



馬拉巴栗可煮食

根可作宣紙粘料

〔問〕：（一）馬拉巴栗（俗稱美國土豆）是否可煮食，市面是否有加工廠收購果實，市價多少？
（二）我有馬拉巴栗幼苗仟餘株，現在是否栽植適期？
（三）前些日子有商人欲買此樹根，據說每公斤約一元左右，是否太便宜？（南投縣信義鄉明德村十一號周榮吉）

〔答〕：（一）馬拉巴栗可煮食，地特松、阿特靈、大生M45、強力愛加善殺蟲淨、賽文地特松、阿特靈、大生M45、強力愛加善殺乳劑。

今年冬季高溫影響

平地梅開花不結果
芽，致開花不結果，是何原因？

〔答〕：（一）馬拉巴栗的根含有黏性物質，最適合作宣紙的黏料，本省宣紙自從用馬拉巴栗的根作黏料後，品質已大為改善，外銷價格較前增加甚多。現已有若干紙廠大量種植，至

拉巴栗種子，加工銷售。每公斤價格為新臺幣廿元。（二）馬拉巴栗幼苗最好在雨季開始時種植，可免灌溉。

〔答〕：（一）馬拉巴栗的根含有黏性物質，最適合

作宣紙的黏料，本省宣紙自從用馬拉巴栗的根作黏料後，品質已大為改善，外銷價格較

前增加甚多。現已有若干紙廠大量種植，至

於根的售價問題，最好由農家與紙廠洽商決

定。（張振甫）

鶯歌桃有栽培價值

〔問〕：（一）埔里七百公尺山地，種植鶯歌桃是否適合？種植幾年才能生產？其產量是否豐富？市價每斤多少？對流膠病之抵抗力如何？其經濟價值如何？（二）仙水（三號李坤峯）

〔答〕：（一）用尿素噴射西瓜，二十公升水要加尿素多少？（三和）

〔答〕：（一）甘藍或番茄均不宜於三月間育苗，瓜類選作雖不太良好，但不妨栽培小胡瓜，如「立秋種」或「近成四葉」。

〔答〕：（一）在埔里七百公尺的山地，可以種植「鶯歌桃」，種植後第三年即可開始生

產，此種桃性豐產，據過去記載，盛產期每株可收穫四十二公斤，其市價不定，與其他水果有關聯，無法推斷，此種桃因粒大離核

力量較弱以外，以不應用為宜。二十公升水

蔬菜

西瓜葉面施尿素易引起燒葉現象

〔問〕：（一）現種西瓜地，收後是

水稻區，但想改種甘藍及番茄。在三月育苗

是否適合，或改種那些蔬菜為宜。

〔答〕：（一）聽說尿素調水後有冷度，故不適合塞

天施肥用西瓜，是否確實？

〔答〕：（一）用尿素噴射西瓜，二十公升水要加尿素多少？（三和）

〔答〕：（一）甘藍或番茄均不宜於三月間

育苗，瓜類選作雖不太良好，但不妨栽培小

胡瓜，如「立秋種」或「近成四葉」。

〔答〕：（一）尿素不適合塞天施肥用於西瓜乙節，無

科學的根據。


〔答〕：（一）日本者製尿素作為葉面噴射時，往往引

起燒葉現象，故除氣溫頗高，根部吸收氮素

力量較弱以外，以不應用為宜。二十公升水



賽文
地特松
阿特靈
大生M45
強力愛加善
殺蟲淨
特快殺乳劑



興農化工股份有限公司

臺中縣大肚鄉中和村中山路十之六號 電話烏日局一〇六號

防治必備・敬請愛用

宜加入尿素一百三十公克，使其稀釋度為一百五十倍左右。（王進生）

蘆筍園耕作避兔傷根

〔問〕：（一）耕作蘆筍是否怕傷根？
〔二〕蘆筍休眠期常枯死，是否會再生？

關西鎮南華里二四號邱乾錦）
〔答〕：（一）蘆筍園在耕作時儘量避免傷根（註減根及吸收根）為宜。但在春肥施用時，會有輕度的傷根，這是不可避免的事實。

（二）蘆筍休眠是一種受氣溫影響，而此乃地上部之養分轉移於地下部之自然現象，也是植株為翌春出筍之準備工作，植株的菜葉雖枯黃，但至翌春仍由地下莖再生嫩莖，成為菜葉。

（三）蘆筍培土工作，於採收前二星期行之，一般於二月中下旬開始。又在採收期間，仍需適當培土。（王進生）

害蟲病

西瓜育苗期 預防腰折病

〔問〕：（一）西瓜播種發芽後不

久，會枯死，附上標本，請鑑定是何種原因？要如何防治？是用塑膠袋育苗。現在天氣寒冷氣溫下降，是否須加覆蓋及經常保持很濕？

（二）西瓜注重基肥好或追肥好？堆肥是否會比化學肥料好？（雲林縣虎尾鎮北溪里四十三號黃文西）

〔答〕：（一）寄來之西瓜幼苗枯死樣本是患幼苗腰折病，應注意下面各點防治：

（1）苗床應設於通風之處。（2）注意灌水，苗床不可太乾或太濕。（3）此病菌之發育最適溫度在攝氏三十三度左右，中午日照強烈時，應在苗床上面（上午十一時至下午三時之間）設架遮蔭，以降低土壤表面之溫度，防止發病。（4）發病時用烏斯普龍或樂生乳劑一千倍液，每坪地灌注八公升左右防治。

（二）西瓜幼苗在氣溫寒冷時應設法保溫，才能使其生長良好，但保溫期間，應注意通風及日照良好，才不會患病或徒長。

（三）西瓜栽植前宜充分施肥，基肥以堆肥為主，其量愈多愈好。又過磷酸鈣與硫酸鉀約全期之半量，亦同時作基肥施用。（陳文郁）

蘆筍發生立枯病

用「施美農」防治

〔問〕：近日我的蘆筍發現有嫩莖受害病（附上標本），不知是何病，如何防治？（臺南市南區鹽埕白里一六五號五達德）

〔答〕：寄來之蘆筍嫩莖受害病標本，係立枯病菌所為害，其防治法：

（一）掘去病株集中燒燬，跡地應灌注「施美農」乳劑或「收穫生」乳劑一千倍液。

（二）多施腐熟堆肥，使地下部生長良好。

（三）採收時勿傷及嫩莖。

勿過度採收，保持植株健全發育。

（四）播種前種子應以「烏斯普龍」一千倍稀釋液浸一小時消毒。（吳麗壽）

作雜

早熟耐濕不耐旱

〔問〕：（一）薯蕷粘土種植甘藷，一

向發育不錯，但一到寒冷冬季，北風吹拂，加上澆灌細雨，就慢慢的枯死，這是不耐鹽的緣故，不知試驗機關有否育成抗鹽力強而豐產的新品種？

〔答〕：（一）薯蕷五十七號甘藷在貴刊發表說是耐濕，但極不耐旱品種。但有說是耐旱性強的品種。不知何者正確？一直未敢嘗試。（學甲鄉民吉村七號黃笑）

〔答〕：（一）甘藷為耐鹽性頗強的作物，在目前育成品種中，以臺農五十七號、臺農九號及沖繩一百號之耐鹽力較強。

〔答〕：（一）根據多年來試驗，臺農五十七號確為耐濕性極強，不耐旱的早熟品種，南部秋作宜在雨水充沛之七八月間種植，如遇旱種植在進入旱季，初期生育受抑制，產量必定降低，但在保水力強之土壤，不太乾之九月上旬種植，收量也很好。（不良）



請用增加豐收的光牌硫酸銨

◎根據日本農林省實驗結果：

硫酸銨與三要素混合施用於水稻、柑桔、鳳梨、香蕉、甘蔗、菸草、花生、豆類、及各種農作物，保證您將會獲得增加單位面積產量二成以上。

◎效用：

- 促進植物產生綠葉素。
- 促進氮（氮素）、磷、鉀、肥料的效能。
- 防止植物之枯死、落葉、果實之掉落。
- 促進植物體內蛋白質及新陳代謝作用，而使根莖強壯，桿部、稻稈，不易倒伏。
- 改良酸性土壤還原為中性。

光正股份有限公司

地址：士林鎮後港里五十五號之一
臺北市懷寧街四十六號
東勢鎮豐勢路三七五號
斗六鎮大同路48號
嘉義市吳鳳路412號



施用硫酸銨可增產一至二成以上

電話：(94) 2556
電話：33327-27170
電話：206
電話：258
電話：4043

產水

本省淺海石花菜

有專人收購加工

【問】：請問在淺海礁石裏所採的石花菜，是否晒乾後外銷？或本省設有加工廠？請惠示本省加工廠或大量收購商為禱。（基隆市安樂區佛祖堂三號許金火）

【答】：本省淺海礁石所採之石花菜，係由專人收購，晒成八分以上乾度後，轉售給加工廠或外銷商，目前本省洋菜加工廠在臺南、嘉義、雲林等地約有六家。基隆地區石花菜有大量收購處，可向基隆市中正五路十號許曉得處洽詢。（水產試驗所）

混養魚注意池水深度

飼養化肥是良好魚肥

【問】：(一) 草、鯉、鯽、鯽及大頭鰱，混養一池，池水深度須幾尺最為合適？
(二) 各種魚苗在臺北，有無出售店？
(三) 魚糞可否作養魚飼料？
(四) 米糠、豆餅、甘薯及水肥如何投入池中？

【答】：(一) 魚參考書，本市那家書店有售。
(二) 魚苗何處有售？(臺北市上海路一段二十一巷二十一號梁仲屏)
(三) (草、鯉、鯽、鯽及大頭鰱混養一池，在理論與實際試驗的結果，成長情形很好，但通常成績的好壞，與池水深度很有關係，不知你的池塘是屬於那一種類型，假若是人工挖的池塘，想放養以上的五種魚類，至少要保持四疊尺的水深。
(四) 各種淡水魚苗，臺北縣(市)都有魚苗商販賣，當然有的可靠，有的不可靠，其可靠的程度是魚苗本身的好壞而言，假如你對這方面有點了解，自己就可知道。

(三) 魚糞是一種很好的養魚有機肥料，桃園魚殖管理處會作長期的試驗，假若方便而價格又不算貴的話，不妨採用。
(四) 米糠、豆餅和甘薯是一種價格較貴的飼料，目前在本省一般養魚戶的摻筋成本原

則下，這種飼料鮮有使用，尤其是米糠，現在除臺東與高雄一帶的虱目魚養殖戶，用作

池底基肥外，普通養魚戶多無使用，現在一般淡水魚養殖業者，多採用化學肥料（即氮、磷、鉀），因此種肥料非但價格低廉，且衛生方便，更重要的是效果並不遜於上述各

種飼料，假若要投放的話，豆餅可打成塊狀拋入池中，任其溶解供魚搜食，米糠可混入水肥，經放存肥池數日發酵後，即可一併投入較淺之處（不可靠近排水口）。

(四) 魚參考書很多書店都有，但多數是英文本及日文本，臺北市開封街「鰻儒堂」書店，似有中文本，暇時不妨前往一查。

(五) 鮭魚，不知你是指白鮭或黃鮭，其飼料均與還是黃鮭？不論是白鮭或黃鮭，其飼料均與別種魚類不同。

(七) 目前臺灣還沒有正式的鮑魚養殖，鮑魚不易取得，市面所售者多為野生，此種

(一) 猪舍圓四面只用支柱並無圍牆，在寒冷的冬天，溫度降至攝氏十度以下，是否對魚苗因多受傷，不易飼養。（安可倫）

(二) 現在是否有更理想的豬舍設計圖？還是照前示之圖建設就可？坐東面西是否合適？

(三) 現在本地未推行「綜合養豬」，如要參加應辦何種手續？(大甲鎮義和里重義路一二二號林朝陽)

(四) 豬舍應設有仔猪保溫架，剛生下的小豬很怕冷，此點在「養豬致富記」一書，第十二頁已有詳細說明。

(三) 「簡易豬舍建築圖」可附郵票三元本社即寄，豬舍最好避免西照。

(四) 大甲鄉迄今未辦理綜合性養豬計劃，

民 豐 牌 農 藥

以嶄新的姿態為您服務



◆ 水稻，果樹等病蟲害之防治

蟲	必	速	滅	多	民	安	特	靈	乳
蟲	賜	滅	螟	乳	多	豐	豐	靈	劑
民	敵	乳	乳	劑	乳	乳	乳	劑	
豐	克	劑	劑						
松	乳								
乳	劑								



民豐牌農藥 民豐化工廠股份有限公司 臺中縣大里鄉內新路59號

電話 5087 • 5088

如農友有興趣，可建議大甲鎮農會，要求農林廳准予辦理（余如桐）

仔豬六週防殺注射 母豬驅蟲孕後二月

【問】：（1）仔豬生後六週齡施兔化疫苗之預防注射，應在何時施行為宜？

（2）母豬是否需要驅除寄生蟲及打預防針，在懷孕後期可否施行，應在何時施行為宜？（昌林口湖鄉后厝村六二號陳文輝）

【答】：（1）仔豬生後六週齡施兔化疫苗前或後，均在生後六週齡施行較為安全可靠。肺疫、腸炎混合疫苗的預防注射，因該疫苗效果不太確實，普遍很少舉行，但不完全無效，亦可試用。時期應在離乳前完成免疫，一般是一次或二次至三次才能有效。（2）母豬的預防注射是每年一次，母豬是每半年一次就夠，如果每年按前項方法預防注射，可在任何時期舉行且安全，如果是頭一次注射，懷孕期間是不能打針的，應在配種以前打針。

（3）母豬的驅蟲應於懷孕後二個月時舉行，使用「比配拉淨」製劑較為安全。（張聯欣）

母兔再配種 要等離乳後

【問】：（1）養兔要投給食鹽時，應如何投法？分量多少？

（2）兔之離乳，以出生後三十五—四十五天較適當，但第一胎出生後三天就配種的，一天後，所生的兔是否會受到營養的不足，而影響發育受止？

（3）各種疾病應如何預防？（雲林縣元長鄉長南村元南路四一號林動雄）

【答】：（1）母兔生後三天就配種，根本不不合飼養原則，無論如何，必須在離乳後再配種。

（2）察兔之食鹽，可加于精飼料中，約飼料總量的〇·五%，但用竹筒裝鹽稍加一點水，並在底部穿一小孔，懸掛在兔籠中亦可。

（3）預防疾病要看預防那種疾病，不過在普通情形下，應注意飼養管理，兔舍乾燥清潔，兔籠要通風，並經常在太陽下晒，飼料要富營養分，如在母兔生後三天就配種，一定會發生病，特別是子宮方面，這就是管理不良。此外尚有許多臨時發生事故，應經常看管，立即處理。（黃主華）

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。

豐年讀者服務部 請答

雪印牌
PF 新型奶粉
日本最大乳業公司出品
世界最高品質的嬰兒奶粉
體腦並健
△含身益膳的乳糖卵蛋白最多
△完全母乳化，最易被嬰兒吸收消化

日本東海牌動力噴霧，灌水兩用機

日本政府JIS檢定合格

幫浦效率最高

附三菱牌單相馬達

牽馬匹及附屬品，

可調換汽油引擎使

用。

重量：17Kg 最高壓力：35Kg/Cm²

常用壓力：21Kg/Cm²

送水量：噴霧每分29公升 灌水每分53公升

柑農・園藝家必備！！


（岡恒老牌）

天下一品

赤白ビニール巻

葡萄鉗

剪定鉗、採果鉗
接木刀、芽接刀
剪定鋸、根接鋸




總經銷：新高貿易股份有限公司
臺北市峨眉街68號

電話：34190號

獸畜及家禽用特效驅蟲藥

芬樂維斯

‘PHENOVIS’ (PHENOTHIAZINE)



侵害家畜之寄生蟲主要者有三，即絛蟲、肝蛭及蛔蟲。其中以蛔蟲最為危險。其細小者，身長僅半寸至一寸，薄若棉線，然在動物體內繁殖，有時竟達十萬條之多，其為害之大，可想而知。

各種家畜體內，皆有蛔蟲寄生，此種寄生蟲往往使禽獸發生貧血病，精力衰退，全身虛弱，若不救治，可能因而致死。

「芬樂維斯」若施用得當，實為最安全可靠之驅蟲藥劑，不論治療或預防，均屬有効。



總代理：英商卜內門化學有限公司

臺北市中正路1800號

總銷處：國際家畜藥物廠

臺北市長安東路一段三九號