

如林農友有興趣，可建議大甲鎮農會，要求農林廳准予辦理（余如柯）

仔猪六週防疫注射
母豬驅蟲孕後二月

【問】：(一)仔猪生後六週輪施驅蟲化疫苗預防後，是否需要舉行肺炎及腸炎混合疫苗之預防注射，應在何時施行爲宜？
(二)母豬是否需驅除寄生蟲及打預防針，在懷孕後期可否施行，應在何時施行爲宜？
(員林口湖鄉后厝村六二號陳文輝)

【答】：(一)豬隻預防注射，免化疫苗疫苗或豬丹毒，均在生後六週輪施行較爲安全可靠。肺炎腸炎混合疫苗預防注射，因該疫苗效果不太確實，普通很少舉行，但並不是完全無效，亦可試用。時期應在離乳前完成免疫，一般是注射二次—三次才能有效。
(二)豬的預防注射免化疫苗疫苗是每年一次，豬丹毒是每半年一次就夠，如果每年按前項方法預防注射，可在任何時期舉行且安全，如果是頭一次注射，懷孕期間是不能打針的，應在離乳以前打針。

【問】：(一)養兔要投給食鹽時，應如何投法？分量多少？
(二)兔之離乳，以出生後三十五—四十五天較適當，但第一胎出生後三天就配種的，而影響發育受止？
(三)各種疾病應如何預防？(雲林縣元長鄉長南村元南路四一號林勳雄)

【答】：(一)母兔生後三天就配種，根本不合飼養原則，無論如何，必須在離乳後再配種。
(二)察兔之食鹽，可加于精飼料中，約飼料總量的〇·五%，但用竹筒裝鹽稍加一點水，並在底部穿一小孔，懸掛在兔籠中亦可。
(三)預防疾病要看預防那種疾病，不過在普通情形下，應注意飼養管理，兔舍乾燥清潔，兔籠要通風，並經常在太陽下曬，飼料要營養充分，如在母兔生後三天就配種，一定發生病，特別是子宮方面，這就是管理不良。此外尚有許多臨時發生事故，應經常看管，立即處理。(黃主察)

【問】：(一)養兔要投給食鹽時，應如何投法？分量多少？
(二)兔之離乳，以出生後三十五—四十五天較適當，但第一胎出生後三天就配種的，而影響發育受止？
(三)各種疾病應如何預防？(雲林縣元長鄉長南村元南路四一號林勳雄)

母兔再配種
要等離乳後

體腦並健

△含極豐富腦的乳精卵蛋白最多
△完全母乳化，最易被嬰兒吸收消化

雪印牌 PF 新型奶粉

日本最大乳業公司出品
世界最高品質的嬰兒奶粉




【問】：(一)養兔要投給食鹽時，應如何投法？分量多少？
(二)兔之離乳，以出生後三十五—四十五天較適當，但第一胎出生後三天就配種的，而影響發育受止？
(三)各種疾病應如何預防？(雲林縣元長鄉長南村元南路四一號林勳雄)

讀者請注意：凡來信詢問農業問題的信件，請附回信信封並貼回信郵票一元，上面寫好收信人的姓名住址。
豐年讀者服務部 謹啓

獸畜及家禽用特效驅蟲藥

「芬樂維斯」

‘PHENOVIS’ (PHENOTHIAZINE)



侵害家畜之寄生蟲主要者有三，即條蟲、肝蛭及蛔蟲。其中以蛔蟲最爲危險。其細小者，身長僅半寸至一寸，薄若棉線，然在動物體內繁殖，有時竟達十萬條之多，其爲害之大，可想而知。

各種家畜體內，皆有蛔蟲寄生，此種寄生蟲往往使禽獸發生貧血病，精力衰退，全身虛弱，若不救治，可能因而致死。


「芬樂維斯」若施用得當，實爲最安全可靠之驅蟲藥劑，不論治療或預防，均屬有效。



總代理：英商卜內門化學有限公司
臺北市中正路1800號
經銷處：國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號


日本東海牌動力噴霧，灌水兩用機

日本政府JIS檢定合格
幫浦效率最高
附三菱牌單相馬達
壹馬匹及附屬品，
可調換汽油引擎使用。



重量：17Kg 最高壓力：35Kg/Cm²
常用壓力：21Kg/Cm²
送水量：噴霧每分29公升 灌水每分53公升

柑農·園藝家必備!! (岡恆老牌)
天下一品
赤白ビニール卷
葡萄鉗
剪定鉗、採果鉗
接木刀、芽接刀
剪定鋸、根接鋸



總經銷：新高貿易股份有限公司
臺北市峨眉街68號 電話：34190號