


風羽雞：八圖



輝雞：七圖

心診斷。

防治：預防本病最有效的方法，是撲滅中間宿主糠蚊，即除注意環境衛生外，發生地的水田、水溝，應噴用殺蟲劑，雖不能完全控制發生，但可減少許多發病的機會。又糠蚊可通過紗窗侵入，紗窗不但妨害通風，而且有助於糠蚊躲藏，不裝紗窗而使雞舍儘量通風，反可阻止糠蚊侵入。舍內牆壁、天花板等，可用長效性殺蟲劑，如 D.T., B.H.C., Asutol 等噴霧，尤其黑暗處的縫隙內，應多加噴射。治療方面，至目前為止，有許多人認為 Coran, Anticon, Atabrin, Anthrycide 及 Furazolidone 有特效，但經筆者試驗，對本病病雞血液中的病原體並無直接藥效，而是對第二次感染病的控制，使雞隻減輕症狀和死亡率而已，所以對本病流行的防止，是毫無幫助的。

預防本病，筆者曾利用七種藥品進行試驗，發現在飼料中配 0.001% Sulfadimethoxine 或 Sulfamethoxy-pyridazine 0.01% Sulfamechazine, 0.015% Sulfisomezole 和 0.0005% Pyrimethamine 等於飼料中，連續餵一百零五天，不但無副作用，且能完全預防本病。Furazolidone 0.01% 對本病感染有抑制作用，至於 Anthrycide 則無預防效力。又此五種特效藥品中，以 Pyrimethamine 和 Sulfamethoxy-pyridazine 最為經濟，對併發球蟲病有較大的控制作用，至於 Sulfisomezole 不但價高數倍，而且似無抑制球蟲病的作用，所以養雞場或飼料工廠應按實際情形，可隨時選用 Pyrimethamine, Sulfadimethoxine, Sulfamethoxy-pyridazine, 及 Sulfamechazine，任何一種使用，不可拿 Pyrimethamine 一種當作萬能藥。

• 啓事 •

家禽衛生特輯(二)
兩期編輯期間，承農復會畜牧生產組林本欽先生多方面協助，謹此致謝。



大王牌

(キング)
農藥

保證原封

◎浸透，擴散性增效劑——(說明書備索)

浸展 (キングシンテン) 包裝 100cc×60 500cc×20

- 特點：**
1. 水稻稻熱病之防治用水銀乳劑或水銀片劑加用本劑 1,000~1,500 倍即能減輕藥害之發生，效力增強持久。
 2. 二、三化螟蟲之防治用 IBN (依必安乳劑) 巴拉松乳劑……等加用本劑即能使藥液浸透到水稻莖內發揮充分殺蟲效果。
 3. 與其他殺蟲殺菌等農藥均可混合使用。節省藥量；將農藥使用量減少二成而加用浸展即能收到同等以上效果。

試驗：將浸展作成500倍稀釋液在芋仔葉反面滴下一小滴，則呈現擴散與浸透現象。用市面一般展着劑做同等試驗則無擴散浸透現象。

◎稻熱病特效藥 **水銀乳劑 (キング水銀乳劑)** 登記證646號 包裝 100cc 300cc 500cc

IBN 乳劑
登記證533號
滴滴微皮乳劑
登記證400號
除蟲菊精乳劑
登記證460號
特寶松粉劑
登記證528號
大滅速乳劑
登記證542號

(キングアイビーエン乳劑)
(キング DV 乳劑)
(キング PGP 乳劑)
(キングデイベテレックス)
(キングジメトエート)

可濕性硫磺粉劑 (キングサルトン75)
登記證408號
蒙穗水和劑 (キングモンゼット)
登記證657號
夏油 95 (キングマシン油95)
登記證211號
耐保根乳劑 (キングネマゴン乳劑)
登記證268號
耐保根粒劑 (キングネマゴン粒劑)
登記證269號

製造元：キング除蟲菊工業株式會社 臺灣總代理：英達貿易有限公司

臺北市華陰街89號 電話46980