


豐年牌農藥



新設備 · 新包裝
帶給您最滿意的服務

◆各種病蟲害之防治

- 馬拉松.....農藥登記第003號
- 甲基巴拉松.....
農藥登記第266號
- 強力保必安.....
農藥登記第531號
- 特快殺.....農藥登記第547號
- 美達松.....農藥登記第561號



豐年牌

興農化工股份有限公司

臺中縣大肚鄉中和村中山路十之六號電話島日局106號

的位置應自幹線道路離開三十公尺以上，與隣接的養鷄場應有三百公尺的距離。

徹底消毒注重預防

要設置焚燒場或土穴，以便處理病死鷄。為排除濕氣、氨母尼亞、硫化氫、二氧化碳和污染空氣，應裝設適當的換氣設備。為保持適當的室溫，應有良好的防寒、防暑設備。鷄舍出入口要設置消毒水槽，以便隨時可消毒。給飼器、給水器等應力求簡便，易於洗滌消毒。

加強衛生管理：絕對避免密飼與各日齡鷄的混飼。經常保持鷄舍內外的清潔，使管理人有消毒觀念，注意飼養器具、衣服、鞋、運搬車的清潔消毒，謝絕參觀並防止野鳥、昆蟲、狗貓的侵入，以免免帶入病菌的危險。為防止空氣傳染，鷄舍和鷄舍之間應有五十呎的距離。有感染的危險時，在飼料或飲水中加入抗生素預防。

發生後的處理：在鷄羣中如發現少數鷄有本病的症狀時，無論大部份有無症狀，必須認為該羣全部感染，原則上應將該羣全部淘汰，並對鷄舍實施數次徹底的消毒，然後至少空出一個月不要使用。除了維持品種系統等特殊目的以外，原則上對病鷄

不做抗生素療法，以免造成保菌鷄，成為本病的傳染源。

感染病雞斷然淘汰

假如不幸鷄羣感染本病時，應斷然整羣予以淘汰，並徹底消毒鷄舍，以斷絕將來的禍根。如無法淘汰的種鷄羣或產卵鷄感染時，才不得已試行治療。目前最常用的是抗生素，使用法如下附表所示。抗生藥的外福來頓 (Furazolidone) 和乃拉

鷄呼吸器性邁可普拉斯瑪病的有效防治藥劑

抗 生 素 名 稱	飲 水	添 加 飼 料	注 射
金 徽 素 (Aureomycin)	配成二百五十倍可溶性粉給與五至七天	每噸飼料二百至五百公分 (Aurofac 10 九一二二五公斤) 給與七至十天	每公升體重五十至一百毫克二至三次肌肉注射
鏈 徽 素 (Streptomycin)	配成一百倍(家畜徽素)給與五至七天	每噸飼料二百五百公分 (T.M.S 一八一四五公斤) 給與七至十天	每公升體重廿五毫克一至二次皮下或肌肉注射
地 徽 素 (Terramycin)	配成二百五十倍 (Terraege) 給與五至七天		
泰 徽 素 (Tylosin)	配成二千倍 (Tylane) 給與三至五天		每公升體重廿五毫克一至二次皮下注射