

農友經驗



插麻竹應先育苗

插植麻竹時常遇到乾旱的天氣，而且灌水又不方便，以致成活率甚低，為提高插植麻竹的成活率，則必須要先行育苗，然後再移植。

我育苗時是選擇陰濕地，或是在水溝邊，然後四邊開溝，溝深五寸，插法是株距六寸，行距八寸，一坪地約四十五株。若是天氣特別乾燥，則應當常澆水、灌水，使它常保濕潤，如此發育自然會好。到五、六月其他工作稍閒時再移植，但移植時竹葉切不可割去，根部不可過份損傷，用這種移植法移植成活率相當高，幾乎株株成活。（嘉義縣中埔鄉濱水村二八號沈耀南）

防治瓜類害蟲——黃守瓜

我們知道瓜類在農家是算重要的蔬菜之一，也含有點農家栽培上的經濟價值，可是在栽培上常常會染上各種病蟲害，尤以蟲害為烈，那就是「黃守瓜」（臺灣守瓜、瓜菜蟲）的為害。現在都用各種藥劑處理，如DDT乳劑，可是用DDT乳劑須注意，否則容易發生藥害；在普通入防治中也有用草木灰、石灰的，現在願以我幾年來的防治經驗，提出供給各農友做參考：



友農利勝



請用增加收豐的光牌硫酸鎂

◎根據日本農林省實驗結果：

硫酸鎂與三要素混合施用於水稻、柑桔、鳳梨、香蕉、甘蔗、菸草、花生、豆類、及各種農作物，保證您將會獲得增加單位面積產量二成以上。

◎效用：

- 促進植物產生葉綠素。
- 促進氮（氮素）、磷、鉀、肥料的效能。
- 防止植物之枯死、落葉、果實之掉落。
- 促進植物體內蛋白質及新陳代謝作用，而使根莖強壯，桿部、稻葉，不易倒伏。
- 改良酸性土壤還原為中性。

光正股份有限公司

廠址：士林鎮後港里五十五號之一
臺北市懷寧街四十六號
東勢鎮北興里豐勢路二七五號
斗六鎮大同路48號
嘉義市吳鳳路412號



施用硫酸鎂可增產一至二成以上

電話：(94) 2556
電話：33327 • 27170
電話：206
電話：258
電話：4043