



農友經驗

插麻竹應先育苗

插麻竹時常遇到乾旱的天氣，而且灌水又不方便，以致成活率甚低，為提高插麻竹的成活率，則必須要先行育苗，然後再移植。

我育苗時是選擇陰濕地，或是在水溝邊，然後四邊開溝，溝深五寸，插法是株距六寸，行距八寸，一坪地約四十五株。若是天氣特別乾燥，則應當常澆水、灌水，使它常保濕潤，如此發育自然會好。到五、六月其他工作稍閒時再移植，但移植時竹葉切不可割去，根部不可過份損傷，用這種移植法成活率相當高，幾乎株株成活。（嘉義縣中埔鄉深水村二八號沈耀南）

防治瓜類害蟲——黃守瓜

我們知道瓜類在農家是算重要的蔬菜之一，也含有點農家栽培上的經濟價值，可是在栽培上常常會染上各種病蟲害，尤以蟲害為烈，那就是「黃守瓜」（臺灣守瓜、瓜葉蟲）的為害。現在都用各種藥劑處理，如DDT乳劑，可是用DDT乳劑須注意，否則容易發生藥害；在普通人防治中也有用草木灰、石灰的，現在願以我幾年來的防治經驗，提出供給各農友做參考：

這是很經濟可以說不必用錢的方法，就是利用野草青蒿（又名艾草、

鬼蟻草，普通農友都把它晒乾，在夏天做燻蚊子的草，葉細小，高一尺左右，有似文竹之葉）。就是把「青蒿草」採幾枝插在瓜苗或種瓜的畦周圍，此時「黃守瓜」飛到附近聞到「青蒿草」味就永遠不敢再親近瓜葉了。這種防治的效果遠勝於一切DDT乳劑、草木灰、石灰等。（桃園縣楊梅鎮高山里二號鄭石城）

養雞剪翅節省飼料

現在農村幾乎每家都有養雞，以做為一種副業的收入，但是一般農友養雞都不知道應該怎樣做才可節省飼料，致浪費很多飼料。

現在我要介紹一種可以節省飼料的方法，就是養雞剪翅，可以節省飼料。

當小雞孵出後的第十六、七小時，就可開始剪翅，因那時雞的翅很小，只突出一點點，此時用無生鏽的剪刀把突出的部份剪除，然後再塗上少許的碘酒，如此便可。照此法去做死亡率很少，甚至沒有死亡。

我養了一百隻本地種的小雞，五十隻沒有剪翅的，五十隻剪翅的，養五個月後，結果無翅的，節省總飼料的三分之一量，並且發育很好。所以我誠請農友們，如果有興趣不妨試養一次。（彰化縣社頭鄉里仁村崙雅巷二七號蕭勝利）



友農利勝蕭



請用增加豐收的 光牌硫酸鎂

◎根據日本農林省實驗結果：

硫酸鎂與三要素混合施用於水稻、柑桔、鳳梨、香蕉、甘蔗、菸草、花生、豆類、及各種農作物，保證您將會獲得增加單位面積產量二成以上。

◎效用：

1. 促進植物產生葉綠素。
2. 促進氮（室素）、磷、鉀、肥料的效能。
3. 防止植物之枯死、落葉、果實之掉落。
4. 促進植物體內蛋白質及新陳代謝作用，而使根莖強壯，桿部、稻葉，不易倒伏。
5. 改良酸性土壤還原為中性。



施用硫酸鎂可增產一至二成以上

光正股份有限公司

廠址：士林鎮後港里五十五號之一
 北連絡處：明正貿易行
 東勢連絡處：東豐太收山
 林區連絡處：豐勝
 嘉義區連絡處：勝

臺北市懷寧街四十六號
 東勢鎮北興里豐勢路二七五號
 斗六鎮大同路48號
 嘉義市吳鳳路412號

電話：(94) 2556
 電話：33327 • 27170
 電話：206
 電話：258
 電話：4043