

爲閣下介紹新藥

試驗場，篤農家，特別推薦

全世界銷路最大，信譽最好之
英國 1 萬倍增強浸透性展着劑

愛 展アイト

1 萬倍展着劑愛展何以受特別推薦？

- ① 展着劑所不可或缺的要件
(固着性、濕展性、懸垂性、乳化性) 均兼而有之。
- ② 對於一切農藥微量要素，肥料用葉面散佈劑均萬能使用。
- ③ 無藥害、無毒性可安心使用。
- ④ 使用 10,000 倍最省錢最經濟。

展黏之好藥不可思議



● 全省各大農藥行均售 ●

英國 PLANT PROTECTION LTD
榮譽出品
臺灣：經華貿易股份有限公司
總經理

あなたの藥劑散布に
優秀な展着劑愛展を

現貨 立 原 行
供應 (豐原郵政信箱 36 號)
電話 637

● 信用可靠 ●



● 世界著名 ●

(防止落果用)

世界唯一!!

植物生長調整劑

アイモン愛蒙

落果防止に科學の勝利
それは落果防止劑愛蒙です

アイモン係粉狀合成的特製品用以刺激及加速插穗與壓條等的生根，誘導鳳梨開花及預防柑桔、梨、芒果、葡萄、荔枝、桃、李與一切瓜類，果實在收穫前落下。

枝が折れても實は落ちない。

「バラ(薔薇)與瓜類ウドンコ病白粉病特效藥免費贈送樣品函索即寄。」

英國植物保護公司



英國 PLANT PROTECTION LTD 榮譽出品

現貨 供應：經華貿易公司
台北市郵政信箱 1764 號



農業信箱



砂質水田漏水

注意肥料流失

【問】(一)砂質水田，插秧後何時施用第一次與第二次肥料？
(二)砂質水田如何施肥，才能減少肥分流失？

失？

(三)預防病蟲害發生，第一次噴藥應在插秧後幾天開始？(屏東東港鎮大潭里九五號蘇清文)

【答】(一)普通在高屏地區砂質水田

，插秧後十一、十二天施用第一次肥料，二十一、二十二天再施用第二次肥料，均在中耕除草同時施用。

(二)砂質水田容易漏水，缺少腐植質，保肥力較弱，肥分易隨水流失，肥效消失較快，欲長久保持肥分可採用：(1)增多施肥次數，每次施肥量不可過多，以增加水稻吸收利用，減少流失。據試驗砂質水田施用硫酸銨分五次，即基肥二十，追肥三次各二十及總肥二十，其效果較佳。(2)淺水中施肥：深水中施肥時，肥料多溶在水中，不被土壤吸收保持，最好在灌水前施用肥料。但在缺水地區，或低濕田及雨季必須施肥時，亦應注意在淺水中施用，並注意施肥後一星期內田水不外流。在沿海地區(如東港等)，乾燥季土壤易呈鹼性反應，鉍態鉬容易揮失，應注意澆水。(3)多施有機質肥料：每分地施用腐熟堆厩肥一千二百公斤左右，於整地前犁入土壤中，增加土壤腐植質

，使土壤保持力增大。(4)密土：因粘土吸肥力較強，砂質土壤如客入粘土，增強土壤保持力，可減少肥分流失。

未推廣稻種不可栽培

【問】：請問現在嘉義縣太保鄉一帶很流行蓬萊品種「南改育四〇號」品種，產量很高，五十四年度一期作普通甲當九千公斤，二期作甲當有八千公斤，收穫量可以說相當好，為何農會不准收購，是何原因？(官田鄉隆田村一〇二號陳順昌)

【答】：(一)查該項品種，因未經改良場試驗完成，不是推廣品種。

(二)該品種品質低劣，碾米率低，又對病蟲害抵抗力脆弱，產量不穩定，故農會不准推廣栽培及收購。(蘇匡基)

樹果

省產橡果尚無外銷

各地宜選適宜品種

【問】：(一)嘉義朴子鎮的水田砂土，因近年連續栽培水稻，田土變成粘硬，是否適宜栽培愛文橡果？
(二)橡果有無外銷？現在栽培面積多少？

(三)何品種較佳？何處有售？
(四)甜漿是否可與橡果間作？有無外銷？
(嘉義朴子鎮南竹里五九號陳德來)

【答】：(一)橡果的抗旱抗濕性較強，對土壤選擇性不嚴，可以栽培。
(二)目前僅內銷，尚無外銷。因私人繁殖種苗甚多，栽培面積無調查。
(三)嘉南地區適宜「愛文」品種，高屏地區適宜「海娜」、「愛文」及「吉祿」三品種，鳳山熱帶園試所有苗木出售，又嘉義及鳳山地區，各大果苗園均有出售。
(四)甜漿可與橡果間作，待橡果至四一五年後，即將甜漿砍除，甜漿無外銷希望。(王兆全)