



(攝屏蔡) 芋紫彩：下。(攝雄宗郁) 稱品良優蕉人美：上

美

人

蕉

彩

葉

芋

栽培要點

美人蕉

優點

- (1) 花形花型及花色富於變化，品種多達數百種。
- (2) 生長強健快速，栽植容易，管理簡單，病蟲害少。

不絕。

- (3) 栽植後一、二個月就可開花，花期周年。
 - (4) 耐瘠耐濕，適於各種土壤。
 - (5) 適於作花壇。
- 優良品種應具條件**
- (1) 株形低矮。
 - (2) 每一花莖花數宜多，花瓣宜潤大。
 - (3) 花莖宜堅強直立，不易彎倒。

郁宗雄

如為已經開完花者，宜離地面二十公分剪短。用種子繁殖時可得變異新品種，但生育較慢，開花期較遲。種子堅硬不易發芽，宜先浸水一晝夜後播種。

(5) 栽植時參照品種高矮，行距五十至六十公分，株距四十至五十公分。植穴宜較大，栽植深度以根莖上面至地面覆土厚十公分為準，植穴內如稍施堆厩肥，更能促進生育繁茂，花叢壯大。生育期根莖漸向地面升高，遇風雨時植株易倒伏，所以宜行培土。

(6) 花謝後宜將花梗剪去，至葉部枯萎時，

栽培要點

- (4) 開過的花未待凋萎，整莖花即自花梗脫落，不在花梗上凋萎枯死。
- (5) 不結種子。
- (1) 美人蕉在陽光充足之處生長壯健，植株較矮，株形優美。在陽光不足之處瘦弱徒長，植株高大，姿態惡劣。
- (2) 美人蕉為淺根性，耐濕不耐旱，在乾燥期長期缺乏澆水時，生長衰慢，老葉向內縱捲，新葉捲曲不開展，花莖軟萎，甚或休眠，所以在乾早期宜酌量澆水。
- (3) 根莖(地下莖)有向地面生長的特性，且栽植後易於繁殖叢生，所以應每年翻種一次。
- (4) 美人蕉普通用分株繁殖，無論在休眠期或生育期，均可行之。將全株掘取後分割時，每一根莖至少有一芽，且須已有鬚根附着者。分割時用整枝剪或刀子，並剪去枯萎根莖，鬚根及宿土盡量留取為原則，地上莖部

再將地上部齊地面剪去，使新株繼續發育生長。

彩葉芋

優點

品種繁多，色彩鮮艷奪目，五光十色，富於變異，且同一植株的葉色，也依葉齡而變化，為最優美的觀葉植物。

特性

(1) 耐熱不耐寒，高溫期生育壯健，冬季露地進入休眠狀態，宜用膠布或玻璃室保溫。

(2) 耐蔭、怕乾、怕強光。強光下葉部因蒸發量大而易發生日燒枯萎，根部因土壤易乾而枯死。

(3) 忌連栽，連栽時根部和球莖容易腐爛。

栽培要點

(1) 彩葉芋忌陽光直射，所以宜置於蔭棚下遮去光線二分之一至三分之二，並可保持較高濕度，使葉色鮮艷有生氣。

(2) 喜腐植質豐富，疏鬆膨軟多孔性排水良好的輕鬆土壤，忌粘重易硬固排水不良的土壤。盆栽時尤宜多施腐熟堆厩肥及草木灰。草木灰有防腐爛、供給鉀肥，且使土壤鬆軟的作用。初植時用較小盆，隨植株發育再換大盆。如在一盆內栽植二、三品種，更可增加觀賞價值。

(3) 繁殖用小球或將球莖分割栽植。用分割繁殖時，切口宜塗草木灰或硫磺粉防止腐爛。栽植或換盆時宜盡量不使根部斷損，同時宜剪去老葉以減少水分蒸發。栽植深度以球莖



(攝球國晚) 什石的麗美

頂部上覆土厚一至二公分為度，深植時球莖易腐爛。
(4) 栽植後每天自葉面洒水一次，追肥可用硫酸銨和氯化鉀少許，但不宜施用過磷酸鈣，否則土面和盆土易生青苔。盆栽時宜將盆子置於花架上，以利排水，避免生青苔。
(5) 彩葉芋很少品種有開花，如見花蕾，宜及早摘去；如進入低溫期，宜注意防風和保溫，否則易進入休眠期。進入休眠期後，宜將球莖掘取，埋藏於半乾半濕的清潔砂土中。貯藏期間如土壤過乾，球莖易乾萎而死，如過濕又易腐爛。

清除洋菇腦菌病原

—— 洪汝煌 ——

本(五四—五五)年期洋菇栽培期間，許多洋菇栽培鄉鎮，都會發生洋菇腦菌病(前叫洋菇塊菌病)；被害菇床，不但無菇可收，且因蔓延迅速，損失慘重。

為免洋菇腦菌病的擴大為害，前經「臺灣省植物保護技術審議委員會」推薦「洋菇腦菌病暫行防治方法」一種，並經省政府農林廳頒佈，透過各級農會指導農戶，採取緊急防治措施，但是按照該辦法使用消石灰粉或硫酸銅液處理罹病菇床，只能抑制病害蔓延；不使擴大為害，並不能完全將病原菌殺死，關於洋菇腦菌病的認識和暫行防治方法，請參看本刊十六卷二期。因此，為避免本年期洋菇腦菌病發生，茲將洋菇腦菌病原，變成下(五五—五六)年期洋菇栽培期間的傳染源，罹病菇舍必須徹底清掃，罹病菇床上的覆土、堆肥，必須加以藥劑處理，消滅病原。

為清除洋菇腦菌病原，省政府農林廳於上(三)月八日邀請農復會、中興大學、省農會、檢驗局和農業試驗所等有關機關的專家和技術人員多人，討論訂定緊急清除方法一種，茲將詳細方法介紹，希望各地菇農注意：

(1) 罹病堆肥(覆土)的處理：將罹病堆肥(連覆土)搬出菇舍外空地，每坪堆肥使用氦氮化鈣(鳥肥)粉末二至二·五公斤，均勻混合堆積，混合時並噴洒適量清水(以堆肥緊握手中有水份滲出為度)，藉以促進氦氮化鈣分解。堆肥堆成寬、高各二公尺，長隨意調整，再用塑膠布等覆蓋物覆蓋，經二星期後始可施用於田間。

(2) 罹病菇舍的清潔：罹病菇舍於堆肥搬出後，應即打掃清潔。罹病堆肥絕對不得殘留於菇舍內。