



(攝屏幕)

## 賞葉花的

# 大岩桐

• 祐昌彭 •

大岩桐是夏季常見的一種球根花卉，種在花盆裏，陳列室內，欣賞葉與花，有無上的樂趣，大岩桐的葉片深綠色或淺綠色，有短柔毛，花為五瓣或六瓣的鐘形，紅、白、紫色或者是一花兩色，質地細緻，好像絲絨，非常高雅。這裏介紹一下大岩桐的栽培方法，有興趣的讀者可以試行栽培。

### 高雅悅目·多采一生

。姿態高雅，非常悅目，花期很長，適於室內擺設。一花開後，另花可以繼續開出。直至秋季以後，溫度漸低，葉片慢慢乾萎，最後完全枯死脫落，球根進入休眠，等到次春開始生長。這便是一株大岩桐的一生。

### 春季四月·小心播種

大岩桐的主要繁殖方法是播種。夏季開花時，如用人工授粉，便可使它結果得到種子。等果實變黃了，便可以採下，取出種子，陰乾或曬乾後，放在袋中貯在乾燥器中，一直放到春季四月再行播種。大岩桐的種子是棕黃色，有光澤，非常細小，所以一定要播在淺盆中。

播種時，先選擇一個淺平的陶質播種盆，洗滌乾淨，再用沸水燙過，然後放入乾淨的細沙，倒入大量的沸水淋洗，消滅沙中的病菌。等沙變涼了，把沙弄平，再把種子播在沙面中。大岩桐的種子很小，所以要小心的散佈均勻，或在種子中滲入少許

細沙，或是將種子放在一張紙上，輕輕彈落，都可使種子分布平均。播種後不必蓋土。然後在盆面蓋上一塊玻璃或一張塑膠布，來保持盆中的水分。盆即放在不受直射陽光的窗旁，在華氏六十五度情形下，一星期即可發芽，發芽移開玻璃或塑膠布，讓幼苗見到陽光，不致長得過於瘦弱。這期間盆中如覺得乾燥缺水，可將播種盆浸在水盆中，播種盆面超過水面半寸，使水從盆底排水孔及周圍細孔進入盆中，供幼苗吸收。

### 移植二次·注意照明

等到幼苗長好了二三片本葉，便要假植一次。如果太晚假植，因為沙中沒有養分供給幼苗利用，幼苗發育不好，影響到以後的開花。假植是用一把鏟子或一根竹籤，輕輕地把幼苗挑起，不傷根葉，再種植在另一個準備好的淺盆中。這個淺盆中，放入腐葉土、壤土及沙的混合物，澆濕了，表面弄平。大岩桐的幼苗便以一寸見方的距離，整齊的種入盆中，種得不可太深，也不要太緊，只要幼苗不會倒伏即好。然後在幼苗之間的土面，灑一點水，水分便滲到根邊，使根與土壤密接無隙。最後將淺盆靠近窗口，以接受充分的非直射陽光，北面的窗口非常相宜。如在陰雨天氣光線太暗，也可用日光燈照明，使生長良好。大岩桐不宜於直射的強光下栽培，但光線過少，生長也是會受阻礙的。又靠近窗口，每隔數日要轉動一下，不使枝葉偏向一方。

大岩桐的幼苗在淺盆中繼續生長，等葉片先有接近的趨勢時，再移植一次，這次是種在四寸或五寸的花盆中，不再移動，讓大岩桐在這些盆中開花。盆中的土仍是腐葉土、壤土與沙的混合物，但腐葉土的份量較多，並加入磷鉀作為基肥，以利開花。這些花盆，陶盆及磁盆均可，不過在磁盆中，水分可以保持較久，所以灌溉次數也可減少。種後仍放在窗口，管理如前，每兩週施用稀薄氮肥一次，生長旺盛，到夏季，便可出現花蕾，開出鐘狀的花。這些花盆，陶盆及磁盆均可，不過在磁盆中，

## 花開二度・最是嬌美

播種當年如管理得當，大岩桐大致都能開花，不過花朵較正常的稍小，而且每株只開一朵花。等到第二年夏季才是開花盛期，但第三年花數又要減少了，需要更新。

花開過後，葉片便慢慢老化，顏色漸漸暗淡無光，質地漸漸失去彈性而變僵硬，此時即減少灌水，讓葉片慢慢乾枯，球根進入休眠。休眠可以自益中掘出，埋入乾沙、鋸木屑或稻殼等，也可以仍然留在盆中不加移動，讓大岩桐第二年仍在舊盆中開花。

大岩桐喜好溫暖、半陰、濕潤的環境，栽培中如能保持這些條件，大岩桐的生育和開花都能理想。在澆水時，要小心不使水滴落在葉片上，以免沾有水斑發病。葉片上如沾有塵土，可用乾淨軟布，輕輕擦去。

大岩桐除去播種外，尚有兩種繁殖方法：一是扦插，另一是分球。扦插是用葉片，摘下發育完全的小球，所以必須用刀切開大球。所用大球，多半是岩桐的球根不能自然生產小球，有些會花的為了迅速繁殖，也有將二年生球切開的，所開的花數當然受有影響。扦插及分球，所繁殖的新株數都較播種來得少，但是能保持品種的特性。

常見的大岩桐可分為兩型：一型花瓣五裂，花朵整齊，葉大且厚，成熟時垂在盆緣。另一型花瓣六或七裂，略不整齊，葉小而薄，作盆花觀賞時，

前一型較美，但葉大易折，不便運輸。所以營利栽培者用後一型者較多。



生先祐昌彭者作文本




ロビン

## 農藥登記

- 馬拉松 第003號
- 甲基巴拉松 第286號
- 強力保必安 第531號
- 特快殺 第547號
- 美達松 第561號

## ※ 噴撒豐年牌農藥請用ロビン噴霧機



防治必備・敬請愛用

興農化工股份有限公司  
臺中縣大肚鄉中和村中山路十之一六號 電話烏日局一〇六號