

花開二度・最是嬌美

播種當年如管理得當，大岩桐大致都能開花，不過花朵較正常的稍小，而且每株只開一朵花。等到第二年夏季才是開花盛期，但第三年花數又要減少了，需要更新。

花開過後，葉片便慢慢老化，顏色漸漸暗淡無光，質地漸漸失去彈性而變僵硬，此時即減少灌水，讓葉片慢慢乾枯，球根進入休眠。休眠可以自益中掘出，埋入乾沙、鋸木屑或稻殼等，也可以仍然留在盆中不加移動，讓大岩桐第二年仍在舊盆中開花。

大岩桐喜好溫暖、半陰、濕潤的環境，栽培中如能保持這些條件，大岩桐的生育和開花都能理想。在澆水時，要小心不使水滴落在葉片上，以免沾有水斑發病。葉片上如沾有塵土，可用乾淨軟布，輕輕擦去。

大岩桐除去播種外，尚有兩種繁殖方法：一是扦插，另一是分球。扦插是用葉片，摘下發育完全的小球，所以必須用刀切開大球。所用大球，多半是岩桐的球根不能自然生產小球，有些會花的為了迅速繁殖，也有將二年生球切開的。所開的花數當然受有影響。扦插及分球，所繁殖的新株數都較播種來得少，但是能保持品種的特性。

常見的大岩桐可分為兩型：一型花瓣五裂，花朵整齊，葉大且厚，成熟時垂在盆緣。另一型花瓣六或七裂，略不整齊，葉小而薄，作盆花觀賞時，

前一型較美，但葉大易折，不便運輸。所以營利栽培者用後一型者較多。



生先祐昌彭者作文本




ロビン

農藥登記

- 馬拉松 第003號
- 甲基巴拉松 第286號
- 強力保必安 第531號
- 特快殺 第547號
- 美達松 第561號

※ 噴撒豐年牌農藥請用ロビン噴霧機



防治必備・敬請愛用

興農化工股份有限公司
臺中縣大肚鄉中和村中山路十之六號 電話烏日局一〇六號