

較近的枝條），使其旁曲，給以環狀或半環狀的刻傷剝皮後，埋入土中，並且固定、蓋土、充分灌水。春季所壓的枝條，當年冬天即可切下而成一新植株。

栽培管理四要項

(1) 位置：種植杜鵑花，首先要注意到她所種植的位置。強烈的風，有時是需要加以防禦的。不過多數的杜鵑花，不但能在冬季的風裏生育，而且還可以忍受夏季熱而乾燥的風，也就是說，杜鵑花栽培在較廣大的土地上，都可以有着較強的適應性質。

杜鵑花最喜愛陽光和蔽蔭交互作用有斑影的地方，或是在一日之內僅僅有部份的充分陽光的地方。假如把她種植在陽光太強烈的地方，那就必需時加灌漑了。灌漑最好用噴洒方法。花壇周圍，大建築物的門口或天井，都是種植杜鵑花較為適宜的處所。較大樹木的邊緣，也是適宜於種植杜鵑的位置。

(2) 移植：移植杜鵑花最好的時期，是在春季，但是在臺灣，可以移植的時期，是很長的。除了炎熱的夏季，一般不作移植工作外，其餘春秋冬三季，都是她相當好的移植時間。

較大植株的移植，仍需要帶有土團，因為挖取時帶有土團，不僅容易種植成功，而且開起花來，特別鮮艷。如果將高山的原產杜鵑花，移植到庭園時，則需種植於較蔭地方，成活和生育才會良好。

杜鵑也是適宜於盆植的一種觀賞花木。盆植的杜鵑花，一年需要換土一次，因為盆內的土壤有限，所含養分當然也是有限的，因此，必需每年換土一次，才能適應植株生育的需要。假如不求新的生育枝梢，只想保持原形的話，則可隔年換土一次。換土的時候，需要剪掉一些舊根，這樣可以促進新根的發生；但是，優良的根，則應儘量保存。

(3) 灌水：杜鵑是一種需要濕潤的木本花卉，尤其在夏季，更是需要多的灌水。春秋時節，每週灌水二至三次。冬季的時候，約一週一次。夏季的時候，植株發育旺盛，需要水分多，所以在五至七月間，需要多的灌水；如為幼苗，每天灌水一次，並需以竹簾等遮蔽物遮蓋日間強烈陽光，直到夕陽西下時才除去。如為盆植，則需置於蔭棚之下，每日早晚灌水一至二次，同時，最好在花盆周圍也澆水，使周圍環境變為濕潤。

至於所用的水，以雨水最為理想，但是需要相當的貯水設備。井水（現打的井水）不適合做杜鵑花的灌溉水，應該儘量避免使用。貯存在水缸水池等的水是好的水。自來水還可以應用，不過都市中用藥品等淨化過的自來水，直接用於花木，是不太適合的。河水僅次於雨水，也是較為理想的水。

(4) 施肥：假如所植的土壤為新土時，可不必急於多施肥，但不是新土的時候，那麼就要注意到土壤的肥力問題。施用化學肥料，可以很快地促進生長，不過要注意所施用的分量，如果施用過多，就會發生不良的後果，甚至有被燒死的可能。施用豆餅、人糞尿、堆肥等有機質肥料，不但安全，並且還可獲得植株生長的優良效果。一般在冬末春初以及初夏時，可以施用些尿素、過磷酸鈣和氯化鉀等肥料，對於她的生育開花等都會有很好的影響。



大王牌

(キング)
農藥

保證原封

◎浸透，擴散性增效劑——（說明書備索）

浸展（キングシンテン） 包裝 100cc×60 500cc×20

- 特點：**
1. 水稻稻熱病之防治用水銀乳劑或水銀片劑加用本劑 1,000~1,500 倍即能減輕藥害之發生，效力增強持久。
 2. 二、三化螟蟲之防治用 IBN（依必安乳劑）巴拉松乳劑……等加用本劑即能使藥液浸透到水稻莖內發揮充分殺蟲效果。
 3. 與其他殺蟲殺菌等農藥均可混合使用。節省藥量；將農藥使用量減少二成而加用浸展即能收到同等以上效果。

試驗：將浸展作成500倍稀釋液在芋仔葉反面滴下一小滴，則呈現擴散與浸透現象。用市面一般展着劑做同等試驗則無擴散浸透現象。

◎稻熱病特效藥 **水銀乳劑**（キング水銀乳劑）

登記證646號

包裝 100cc 300cc 500cc

IBN 乳劑
登記證533號
滴滴微皮乳劑
登記證400號
除蟲菊精乳劑
登記證460號
特寶松粉劑
登記證528號
大滅速乳劑
登記證542號

（キングアイビーエン乳劑）

（キング DV 乳劑）

（キング PGP 乳劑）

（キングデブテレックス）

（キングジメトエート）

可濕性硫磺粉劑

登記證408號

蒙穗水和劑

登記證657號

夏油 95

登記證211號

耐保根乳劑

登記證268號

耐保根粒劑

登記證269號

（キングサルトン75）

（キングモンゼット）

（キングマシン油95）

（キングネマゴン乳劑）

（キングネマゴン粒劑）

製造元：キング除蟲菊工業株式會社

臺灣總代理：英達貿易有限公司

臺北市華陰街39號 電話46980