



# 豬仔的乳離期早



欣聯張



加飼料。大約過了二週就開始給與教槽飼料（哺乳飼料），從少量開始，慢慢增加給與量，可以使仔豬獲得充分的營養而繼續成長。

## 教槽飼料

### 參考配方

哺乳飼料應含粗蛋白質百分之廿一以上，並配有紅糖、脫脂奶粉和黃土等在內，適合仔豬的嗜好，下面的附表是兩種哺乳飼料的配方，供大家參考。

養過母豬有經驗的人都知道，早期離乳有很多好處。例如可提早發情交配，每頭母豬每年可生產三至三點二胎小豬，並可使仔豬發育整齊而快，提高飼料利用效率等。但如早期離乳的方法不適當，反會影響仔豬將來的發育，所以離乳前後的飼養管理是很重要的。

## 防止貧血下痢就少

### 放入紅土仔豬愛食

仔豬生下來，至少需要二至三週才會吃飼料，在這過程中；單靠母乳中少量的鐵質，實在不够造血，因此容易引起貧血。所以要在出生後二、三天在豬欄角的地面上，放入乾淨的紅土，讓仔豬玩和吃，那是造血用鐵、銅等元素的來源。如此不但可以預防仔豬初期的貧血，且可預防出生後一、二週齡時容易發生的白痢。仔豬不貧血，白痢的發生就少，祇要經過那階段，以後就很少發生下痢，仔豬的發育和成長就快，育成率就因此提高。

母豬分泌的乳量，到了產後三週左右已達最高峯，以後漸漸減少，因此仔豬漸次吃不飽，必需添

次數亦加以控制，可用欄柵隔開漸次減少次數，到了離乳當天把母豬趕開完全斷食，僅給飲水，預防發生乳房炎，等離乳以後再漸漸恢復飼料量。

## 早期離乳容易下痢

### 飼料小心加強保溫

早期離乳的仔豬仍留在原豬欄繼續養至八週以上才能移入其他豬舍，如果離乳初期飼養管理不當，常誘發輕重不等的腸炎而發生下痢，輕的影響以後增重，重的發育受阻易遭淘汰或死亡等，直接影響離乳頭數和窩重，損失不小。

早期離乳容易發生下痢的原因，多為母豬隔開後，仔豬得不到暖氣，腹部受冷，吸不到乳水，缺乏水份，亂飲豬欄內穢水，因而腸道細菌（主要為

溶血性大腸桿菌）的增殖，產生毒素而引起腸炎下痢。

離乳前後的飼養管理應特別注意：①繼續餵哺乳飼料，不能變更內容。②加強保溫，紅外線電泡的保溫或增加乾燥的褥草。③給與清潔的清水。④飼料內添加控制病原細菌的藥物，這對防止下痢，最為有效。

## 添加藥物促進成長

### 成本雖高但省飼料

據臺灣糖種畜場的試驗，哺乳飼料每百公斤中加入金黴素十公克和混合黴素五公克，從離乳前一、二天開始餵食，就可以完全防止仔豬下痢的發生，和促進仔豬發育的雙重效果，雖然因加藥而增加飼料成本，但可以防止發生下痢，增重不會停留，育成率亦提高。每頭每天的增重會顯著的增加，而且每增重一公斤所需飼料費反而減少。各位農友如按本文所說的方法去做，將使你增加不少的利益。

### 哺乳飼料配方表

飼料名	配方一	配方二
大豆粉	二五	一一
花生粉	八	一〇
酵母粉	一〇	一〇
脫脂奶粉	四	一〇
魚粉	四	一〇
玉米粉	一〇	一〇
甘薯簽粉	一〇	一〇
紅糖	一〇	一〇
脫脂米糠	一〇	一〇
魚肝油	一〇	一〇
歐羅肥	一〇	一〇
骨粉	一〇	一〇
石灰石粉	一〇	一〇
食鹽	一〇	一〇
紅土	一〇	一〇
合計	一〇〇	一〇〇