



閒話……

曇花

——王文成

性喜高溫不耐霜雪

曇花原來產在墨西哥高原，屬仙人掌科植物，學名是 *Epiiphyllum oxypetalum* Haw. *Epiiphyllum* 字意「葉上開花」，象徵花着生在葉上開的意思；實則花着生在莖不是葉上，這即表示本屬植物的葉已完全退化無遺。它的葉狀莖的兩邊，各具缺刻若干，那就是節；花着即着生在節上而開放。

，而是莖；因它形狀扁平如葉，所以人多誤以為葉。按仙人掌科植物的葉大多退化，我們平時所習見的刺便是葉的變態；而本屬的植物甚至連刺亦隱而不見，這即表示本屬植物的葉已完全退化無遺。它的葉狀莖的兩邊，各具缺刻若干，那就是節；花着即着生在節上而開放。

Epiiphyllum 一屬的植物種類很多。花有白晝開放的，有夜間開放的；花瓣有紅有黃有白；雌蕊的花柱有紅有白；形形色色，不一而足。在園藝上的雜交種多至數百種，而普通栽培以供觀賞用的種則不多，僅八、九種而已。臺灣栽培的，根據記載共有五種。

上列五種，以 *E. oxypetalum* Haw. 一種最為普通，今日所謂曇花即指此一種而言。在臺灣原無什麼名氣，日本明治四十餘年間日據時代，偶然發見在總督官邸的一角，有人喜歡那種花的清秀，有如冰肌玉骨；並因它花期短促；且在夜間開放；所以有「月下美人」之稱。

曇花的性質強健，生長旺盛，不需多大管理，即可抽莖長枝，開花結實；但性好高溫，不耐霜雪，不適於一般溫帶地方的栽培。我國大陸氣候遠較臺灣為冷，適於生長的時期較短，開花的次數很少；且入冬必須放在室內或溫室內保護，管理不便，栽培稀少，因此很珍貴。臺灣却不同，既無霜雪，又無生長期短促的憂慮；冬不必入室，夏略加蔽蔭，即可使它生長良好，發育迅速；每年自暮春至晚秋（臺北）開花少則三、四次，多則八、九次；南北各地都很普遍；單就臺北一地而言，前日人的私人庭院間多有栽培，或盆栽或壇植，以為點綴，高可達一丈多，開花前仆後繼，自夏至秋，陸續不絕，便不見得名貴了。

品出譽榮司公業糖灣臺

台糖飼料酵母粉主要成份：

菸鹼酸	維生素 B ₂	維生素 B ₁	灰份	纖維維	脂肪	蛋白質	水份
45mg/100g以上	5mg/100g以上	1mg/100g以上	9%以下	2%以下	1.2%以上	45%以上	8%以下

料飼



質白蛋高
料飼命他維

粉母醇

馬	牛	豬	鴨	雞
7	6	5	3	3
%	%	%	%	%
8	8	8	5	5
%	%	%	%	%

- 料飼省節(四)
- 肥快大快(一)
- 養營富豐最有含
- 間時養飼短縮(五)
- 疫防壯強(二)
- 收吸易容，素
- 益收加增(六)
- 蛋生加增(三)
- 下如效功其

號七〇一段二路北山中市北臺
三六〇三五·八三六〇五：話電

司公限有業企福糖 銷經總