



促進

葉子

綠化

的藥

如果使用

Morphactins

類的一羣新化學物質，可以培育成一種矮而密茂的植物

地毯，以供美化公路兩旁或競技場綠地之用。

這類化合物，從它化學成分來說是為 Fluorene-9-carboxylic acid。這是由西德 E. 墨爾克公司研究所的 G. 許奈達等五位博士，研究所獲的成果。

若經用這類化合物，便能培育成一種奇妙至無法形容小型化的，密生葉子的一種植物，而且它的葉子會漸漸變成暗綠色。

經此法培育的植物，不但呈現健美的綠色，同時也不會長高，並能節省剪草的費用。若使用在果樹園或葡萄園裏，還能阻止幾種雜草的密生。此類化合物，在土中僅經幾週便會失去效力而被微生物功能所分解，對於哺乳動物或魚類，據說並無害處。(朝林取材自「科學朝日」三月號)

缺乏磷鈣猪生鼻炎

猪萎縮性鼻粘膜炎，可能會改變猪鼻骨的組織，而使猪鼻引成彎曲。但並不是傳染病，而是由於缺乏適當的平衡飼料，引起營養失調所致。這是三位美國的獸醫專家，最近在一項集會上發表的資料，他們發現猪飼料中如有不適當的鈣和磷，便會引發這種病，這使美國農戶每年要有近百萬元損失。科學家們指出，當猪隻發育最快的時候，鈣質的消耗特別高，因此必需和磷作適當比例的補充，才能預防發生猪萎縮性鼻粘膜炎。

康奈爾大學的科學家們，曾以廿八頭三週齡的

健康仔猪，給予七種不同配方的玉米和大豆類混合飼料，所含鈣與磷質的成分也各不相同。結果在正常水準以下即缺乏鈣、磷的仔猪，顯然生長遲緩、發育不全、容易生病、鼻骨退化和甲狀腺腫，甚至其中有兩頭的大腿骨，沒有因為任何外力竟會骨折。(惠仁譯自 USIS Feature)

定時擠奶產量最高

美國賓西法尼亞州立大學的農牧專家說，如果要從高產量的母牛身上，得到最多的牛奶，則需按照每天擠兩次的次序，盡可能依規定每隔十二小時擠一次，且在同一時間去擠。

專家們曾按四、八、十二、十六及二十個小時的間隔，擠了成羣的荷斯汀牛和瑞士棕牛；牛奶的分泌率，和以四、八以及十二小時間隔的完全一樣，大約平均每小時泌乳二點七五磅。據一位專家泰勒說，他的研究結果也指出了這種現象：如果由於電力發生故障，中間只是漏擠了一次的話，可能便要減少百分之十五，如果每天只擠一次奶，牛奶的產量，將降低百分之四十。(朱捷譯自 Successful Farming Feb. 1966)

研究新法處理肥料


美國普渡大學的農業專家們，為了尋求處理牧場動物排泄物的最佳方法，正進行一項長期性的研究實驗。

他們新設計了兩種方式，正和目前一般的方法在作比較。那二種新設計是：第一羣為數大約二十頭的乳牛，被放置在一個有水泥條板的自由牛欄裏，下面有一個坑，用唧筒把液體肥料抽出，在必要時把它運往田間。

第二羣牛被放在類似的一個欄裏，但是裏面裝有已經證明為更革命性的肥料處理設施。即一套藥式系統，分配相當數量的氧氣，通過泥、水和坑裏的液體肥料。

專家們認為這樣可能有很大的百分比的肥料，因此法而予以氧化和破壞。(朱捷譯自 Successful Farming Feb. 1966)

快帆牌動力噴霧機出品了！



MK-101型

性能特優輕便，美觀可與外貨媲美。
經省檢驗局檢驗符合國際標準。
農林廳、糧食局皆有備案，各地表演曾受到好評。
大量外銷東南亞，非洲、南美洲各國。
服務週到，全省各地設有服務中心。

益洋企業股份有限公司
臺北市長春路189號 電話 56943
明工社股份有限公司
臺中市復興路3段372號 電話4780

防毒面具 與農牌



徵求各地經銷商

- ①獲得十年專利
- ②絕對安全之防毒用具

連絡處：吉田工業社
臺中縣大里鄉內新村內新路42號之4