

故在本省如地理環境及管理得當，該有幾十年之壽命。
〔到目前為止，介壽果之利用價值很高，銷路很好，惟將來性如何，當與進口情形有關。〕（翁仁祿）

筍竹

如何？

〔問〕：〔目前栽種綠竹，前途如何？〕

〔答〕：綠竹有何品種？據說有硬枝、軟枝、突目、凹目之分，確否？

〔綠竹種植次年可否採筍？以第幾年產量最高？〕

〔綠竹有什麼方法可以促進提早生筍？〕

〔綠竹有烏脚綠與普通綠竹兩種。〕

〔如管理周到，於栽植次年可採筍。至第四一五年產量較高，年產量有一千一五百公斤。〕

〔除提高溫度外，無其他有效方法。在本省之氣候條件，無須作促成栽植。目前潮州一帶之綠竹，其出筍最早，此乃因氣溫條件較其他地區優越之故。〕（王進生）

麻竹一月間種植

每年六七月採收

〔問〕：〔去年栽種麻竹，明年已第三年，今年已有四、五支幼株，可否掘取移植？〕

〔麻竹株距幾尺？每甲地種植多少株？平插竹杆應取幾年生為宜？〕

〔生筍價好或筍干好？筍干製法如何有收購？怎樣製法？〕

〔四黃黃有何用途？每斤價格多少？何處有收購？怎樣製法？〕

〔荳仔薯如何留種？〕

〔路路何時收穫為宜？〕（臺東大武鄉大武街三號陳水和）

〔答〕：〔冬季中耕晒土時，用斧頭將鞭根切斷（連竹幹）移植。現已過時，俟明年一月間辦理為宜。〕

〔麻竹株距二十一十五英尺，每甲地種植五百一十六株，母竹以滿一年生較佳。〕

〔生筍價格較好，筍干製法請參考本刊十二卷十期三十三頁「筍干製造方法」。〕

〔四黃黃可作加里粉、加工品素色等。價格不詳。黃黃係熱帶作物，目前旗山栽培較多，故請向旗山農會詢問為宜。其製法係將球莖乾燥後研成粉。但輸出日本時，均以球莖（乾燥）輸出。〕

〔荳薯的留種，可將植株所開的花留下，無須摘蕾，但留種之荳薯，因營養關係，塊根細小。〕

〔荳薯於六、七月間收穫。〕（王進生）

〔路路於六、七月間收穫。〕（王進生）

蟲病

馬拉松治積谷害蟲 殘留藥効期太短

〔問〕：貴刊第十六卷第三期農友新知欄載：「馬拉松噴射小麥減少倉庫穀物害蟲」，報導澳洲與阿根廷，使用馬拉松於倉庫器具，甚至摻入穀物中以防止蟲害，此種方法如確實有效，本省值得仿效，以減少積谷之損失。本省各地貯藏穀物或花生餅、米糠、麩皮及豆餅等飼料之倉庫內，常發現害蟲滋生，損失甚大，如照澳洲等摻入馬拉松以防止害蟲生育，則馬拉松乃為劇毒殺蟲藥，是否有餘毒遺留於穀物或飼料內，對人畜有害。故宜請試驗機構作週詳而慎重之試驗。敬請將此事反應農復會、糧食局、農林廳等機構。〔臺糖新營副產加工廠廠家 願〕

〔答〕：馬拉松粉劑防治倉庫害蟲，據本省農試所試驗，有良好的殺蟲效力，但因該粉劑的殘餘毒效消失很快，如摻入積穀中，只能維持一個月左右。本省積穀貯藏期通常約需四個月以上，亦有一年以上者，故該粉劑不甚合乎本省預期貯藏穀谷防治用。但如花生餅、豆餅、麩皮及米糠等飼料，若貯存期不長，整塊豆餅當可噴佈其外表，而麩皮、米糠等類，則必須混拌才能見效。如使用濃度在八P.P.M以下，對家畜並無危險。今後對積穀如有適當燻蒸處理，該劑或可與其他藥劑配合使用。〔林權〕



瘡痂病特效藥



農藥字第五二一號

經銷處：泰洋股份有限公司
東益貿易公司
正豐化學股份有限公司
總代理：惠農股份有限公司
製造廠：Chevron Chemical Company ORTHO Division U.S.A.

臺北市重慶北路2段108號
電話：44994
臺北市南京西路26號2樓
電話：43802
臺中縣霧峰鄉草湖路2號
電話：霧峰63
臺北市長安東路2段16號
電話：52093

現貨供應

歡迎採購