

必須停止採收，讓植株恢復株勢，而這時需要養分，必須及時補給。自停止採收至翌春採收期之間，北部約需九十天，中部約需八十至八十五天，南部約需七十五至八十天。秋肥的施用方法，先將行溝掘鬆，然後將肥料施入，並用鋤頭或其他工具將春季所培的土壤翻鬆來覆蓋肥料（堆肥、化肥或調合肥料）。

在乾旱的季節，每星期引水入畦灌漑一次，並隨著根部的伸長和生育，逐次增加灌漑水量。

舉行培土·切忌過厚

生育期中，應視地上部生長和嫩莖，增大情形酌量培土，厚度以植株不致倒伏為準，不可過厚。定植後二至三個月，培土厚度可達到八至九公分，略與園面平。

嫩莖發生之前培土，可避免嫩莖在伸長過程中感光軟化。

依本省氣候條件來說，嫩莖的採收長度，以不超過十六至十七公分為宜。又在採收時，須留三至四公分的莖基部，所以，培土厚度以約在地下莖上而二十一公分為佳。

目前全省各地的培土厚度都嫌過厚，甚至培到三十一至三十五公分，影響嫩莖的發生和伸長的速率，如再考慮栽培地的砂質特性，三、四年生的蘆筍，培土厚度最多也只需二十四公分。在採收期間，培土厚度應慢慢的減少。

在豪雨和強風期，因為砂土易受沖失或吹散，

應注意補行培土，以免嫩莖軟白部分參差不一。


保護母莖

提高品質

本省蘆筍採取留莖採收的栽培方式，所以在採收期間，必須設法保持母莖的壯健。留莖初期，在嫩莖尚未發生之前，開始噴射「大生七八」可濕性粉劑四百倍液或「武田滅菌」一千倍液（加用展着劑）預防母莖部發生褐斑病。

適宜的母莖大小，為嫩莖直徑一·二至一·三公分左右的嫩莖。一般以選留中大嫩莖作母莖為宜。

留莖採收雖有優點，但也難免有若干的缺點，所以須以適當方法來補救。例如在常刮強風的地方，母莖搖動劇烈，甚至基部被吹斷失去留莖的目的。為兼顧留莖的功能和採收工作方便並減少風害，不妨將嫩莖地上伸長期於側枝發生初期約留二十枝的側枝數其先端用手摘心，以免先端倒垂。如果支柱材料豐富，宜用竹子立支柱，防止母莖動搖減少風害。




法植定準標的筍蘆

8 公斤重的輕量

有光動力噴霧機

MD 35 型新進口廉價供應
噴霧、粉、粒、火四種用途

臺北市武昌街二段一八號之一
有光資材商行



雌株所結的漿果，須於初期用手摘除，以免隨着漿果發育而消耗養分，減少雌株產量。這種工作可隨時隨地利用休息時間舉行。

贈送！

最新農業推廣小冊

請沿點線剪下左表，在你需要的書名上面（即□內）畫一✓記號，並把自己的詳細住址和姓名填好，附所需郵票，封入信封內。

來信請寄臺北市伊通街一〇六巷二七號豐年讀者服務部。

例：你需要「養豬致富記」「養雞姻緣」和「農家醬油釀造法」時，請附郵票八元（3元+3元+2元）。

- 五十五年豐年曆書……………附郵五元
- 養豬致富記（增訂再版）……………附郵三元
- 養雞姻緣（再版）……………附郵三元
- 簡易豬舍建築圖……………附郵三元
- （附沼氣池青貯窖設計）……………附郵三元
- 牧野改良概說……………附郵五元
- （臺灣適用牧草品種介紹等篇）……………附郵三元
- 洋菇培養法（增訂三版）……………附郵三元
- 新法堆肥……………附郵二元
- 農家醬油釀造法……………附郵二元
- 雲南大頭菜加工法……………附郵二元
- 塑膠袋育苗造林法……………附郵二元

住址：
姓名：