閒話：曇花

王文成

同時發莖很有規律

（續上期）

花蕾的發生僅限於高溫季節；臺北一般是初夏至晚秋，而新枝的萌發則無季節上的限制，一年四季都可能有，但最旺盛的時期是春初至夏末。或是早春晚夏，是它的生長時期，初夏深秋是它的開花時期，花蕾的出現多在半年以上的老葉狀莖上，着生在三、五月新抽的葉狀莖上的極少。

用葉狀莖扦插時，自仲夏至晚秋初扦插的插穗上也常可發見有花蕾出現，大小和形狀都和正常的一樣；但此種花蕾通常僅能發育至二、三公分長而中止，以後即自行枯死脫落，無法繼續發育到開花。此種不正常的現象，僅發見在生長不很良好的插穗上；生長良好的插穗是否也能發生，還有待將來的觀察調查；但按常理推測，極少發生。花蕾發生在插穗上是一種極不正常的現象，影響母株的發育和新枝的萌發，扦插繁殖時要注意。

曇花花蕾的出現，如同潮汐的漲落，極有規律，通常半月或一月萌發一批；發育則更有規則，一期內極少有花蕾大小相差懸殊的紊亂現象發生。不但一盆上如此，即使十多盆一處，盆盆如此。一盆上有花蕾出現時，盆盆都有花蕾出現，大小彼此相似，發育也彼此相等，實在是一種奇異的現象。筆者還沒有見到或聽到有大小長短不同的各種花蕾，同時懸垂在母枝上，而能繼續成長發育和陸續開花的。根據筆者初步調查，在普通的栽培情況下，花蕾的發生，有下列二種現象：

（1）一旦稚蕾出現，成長發育已達長二、三公分以後，第二次新蕾即不再發生；即使發生也都立刻枯死消失，或殘留在母枝上而不發育。待前批花蕾發育完成，開花凋謝以後，第二批新蕾才發生，或原殘留在母枝上的稚蕾才繼續發育，而成第二次開花。

（2）有時第一批花蕾正在發育之間，第二批花蕾即開始出現；待第一批花蕾開花時，第二批花蕾已發育至長一公分左右。

蕾多花少彎曲無定

曇花蕾蕾出現的數量有時很驚人，一盆上可多至三十至五十個，一葉狀莖上可着生七八個，但其中能發育完成直到開花的則很有限。筆者曾幾次細心觀察，常發見當日米粒大小的稚蕾多至二十至三十個，隔一天再看，已消失一半有餘，再隔一天更所留無幾，能繼續發育至長達一公分以上的極少。

（未完，下期續）

為閣下介紹新藥!!

試驗場，篤農家，特別推薦

※全世界銷路最大，信譽最好之英國1萬倍增強浸透性展着劑

愛展アイテン



◉全省各大農藥行均售◉

1萬倍展着劑愛展何以受特別推薦？
①展着劑所不可或缺的要件（固着性、濕展性、懸垂性、乳化性）均兼而有之。
②對於一切農藥微量要素，肥料用葉面散佈劑均萬能使用。
③無藥害、無毒性可安心使用。
④使用10,000倍最省錢最經濟。

展黏之好※不可思議

英國植物保護公司榮譽出品

臺灣總經銷：經華貿易股份有限公司

あなたの薬剤散布に優秀な展着剤愛展を

現貨供應 立原行（豐原郵政信箱36號）電話 637


新發明品發售!!

一切瓜類、豆類、薔薇、草莓、花卉、蕃茄等。

白粉病（ウドンコ病）の特效藥!!

メロン乳劑

藥害がなく安心して使へます



特徵：
①對於白粉病、葉斑病、ボトリチス病均有特效。
②絕不發生藥害，污點，葉斑，請放心使用。
③高溫時亦可安全使用。
④人畜無害。

日本 安田化學工業株式會社 榮譽出品

總經銷：經華貿易股份有限公司

臺北市郵政信箱1764號