

怎樣減少豬病的損失？

趙法清

目前本省的養豬事業，雖已獲有良好的成就，但因飼養管理失宜，以及疫病等所遭受的損失，為數仍多。本篇是特別說明豬病和寄生蟲方面防止損失的要點。

慎選購入猪隻

多猪病是在買進來時發生的，當你在買猪以前，須調查猪羣的健康情形。如果是購進種猪時，最少需在配種前三十天，同時應和其他動物隔離，最少亦需三十天，如此可避免猪隻遭受傳染病的危險。此外，在國外更須作流產病（Brucellosis）和鉤端螺旋體病（Leptospirosis）的試驗。

在發覺有病狀開始時，就將病畜從猪羣中隔離，將來治療或恢復送回豬羣時，仍應定期的消毒猪舍，管理人員的鞋和用具等。鳥、狗和鼠一類的動物，都能帶菌傳染病菌，所以應嚴禁進入或撲殺。死亡的動物應燒掉，或用生石灰深埋泥土中，最少要有三尺深。

畜主應不准許任何賓客進入他的猪舍周圍，以及猪舍內參觀，否則就應該準備一消毒池或盆，以備每個人包括工作人員在內，進入猪舍和場地以前應用。

定期免疫注射

污物能隱藏很多的疾病和寄生蟲，因此所有的建築物應備必須清潔消毒，哺乳和保育的仔猪最好應用蒸氣噴射，對其他的猪隻，猪舍清潔以後可再用消毒或用水洗滌。倘洗滌不很充分時，陽光和乾燥亦同樣有殺滅病菌的功効。

收穫，牧草的耕犁最少一年一次。配種期猪隻的健康，可影響到受孕率，以及仔猪的大小和健康。凡配種的猪羣，必須一年舉行一次猪瘟免疫注射。同時，母猪在配種前，必須施行丹毒和鉤端螺旋體病的免疫注射。但以上各種免疫，不能在配種後五週時施行，且懷孕的母猪，最好不能施行猪瘟免疫注射。

猪舍注意寒暖

母猪在分娩前三十天，應用比配拉淨（Piperazine）驅蟲，猪虱和疥癬亦最少須在分娩前三十天用BHC或氯化物（Chlordane）用噴霧器噴射，但不能噴射分娩後幼小的仔猪。總之，母猪在懷孕開始時必須保持良好的狀態。此外，良好的飼料，是對猪最好的滋補品，尤其是對還沒有生產過的猪隻，更是需要。

分娩前三至五天的待產母猪，必須用溫暖的石鹼水洗刷猪體，以及事先用消毒水消毒分娩猪的猪欄。

遇寒冷的氣候，要保持猪隻乾燥，並有舒適的墊草，或有保溫燈的裝置設備，使仔猪不受寒冷，或地面不受潮濕。倘在酷熱的天氣，應在水泥地或木製的地板猪舍地面噴水，猪舍和周圍地面每天亦須同樣噴灑潮濕。對所有的猪隻更應避免灰塵，尤其是幼小的猪隻。此外對分娩的猪舍在生產期不但

有兩種最簡單的消毒方法，就是用鹼水和克來蘇兒（Kleasol）浸洗。倘用鹼水（Lye）時，可在二十加

磅的熱水中混一磅鹼，用克來蘇兒時，在一加侖水中混一磅克來蘇兒。要減少仔猪因寄生蟲的寄生，則必須施行輪牧，每年輪流

要舒適，更要通風和通氣。有些初生仔猪倘飼育不當，據估計約有百分之三十五不能達到斷乳。其他有時仔猪管理失宜，估計可能有百分之六十左右受到損失。下面是預防這些損失的方法。

預防仔猪下痢

初生的猪，必須剪短尖銳的齒，切斷臍帶和剪耳號，應用百分之七碘酒。當出生二、三天的猪隻，注射鐵劑可預防貧血和白痢。倘飼養在水泥地二十一天的猪隻再發生貧血時，亦可用若干清潔的泥土或帶泥土的草根給它舐取。

仔猪去勢，應在十至十四日齡。斷乳在八週齡時，猪瘟和猪丹毒的免疫注射，應在斷乳前後二週施行。仔猪斷乳是在六週齡時，免疫注射在八週齡。仔猪驅蟲，則應在免疫注射後二週。

仔猪下痢控制最好的方法，是在良好的管理，應避免仔猪寒冷，以及溫度和飼料的突然變更。母猪便秘和發熱亦為仔猪下痢之一，生產母猪在分娩前後所餵的飼料，每天可用四分之一的麥麸來代替，又須避免突然增加分娩後的母猪用完全飼料。

經常供應清水

斷乳後個體微小和體重不足的仔猪，倘在八週齡時它達到四十磅的體重，則必須好好的管理，同時更須有好的飼料來幫助生長，才能獲得良好的發育。

營 養對猪隻的生產最為重要，如營養的配合，飼料的新鮮程度，以及副產品應用的有效情況等都須注意。此外，人工的管理，對猪隻必須有適當的環境和經驗，如此猪隻才能很快的生長。一種完全的平衡飼料，除應用各種飼料配合外，更須注意每種飼料所供給的營養分，並加以正確的計算。

控 制飲水雖可減少浪費，但對猪的飼養上是非常重要的。所以要用微小而不斷的給水，供它消耗，這對肥育猪的生長是很適合的。根據估計每磅飼料，可增到二倍的飲水消耗量。種母猪和哺乳母猪飲水供應的變化更大，懷孕母猪水的消耗量每天約需一至三加侖，哺乳母猪每天約三至五加侖。