

、七成；如遇八、九月有颱風雨時，收成不會減少。二十五頁插圖是在山頂上栽植的甘藍，完全靠天然雨水滋養，生長情形非常理想。

定植時不需要作畦：緩傾斜或急傾斜的山地，如照平地習慣作畦栽培，不但浪費時間，反而生育不良，應求自然地形，等高平植，或斜向拉直定植，株數不會少於平壟階段的數目。若干公營機關的栽植地，為求美觀，一律作成平臺階段，每個平臺內外，土質相差懸殊，生育情形很不理想，產量並不增加。如依自然地形平植，至八、九月間颱風季節，所栽蔬菜已撫育成莖，葉面相互密接，覆蓋地面，雖遇颱風，土壤也不易流失。


定植距離寬行密植：不論栽培任何品種，為適合市場需要，都可用距離來調節球型大小；如定植距離太寬，個體一定增大，出售就不容易。大型品種如長岡交配一號、陽春甘藍等，定植時應採行寬六公尺，株距四·五公尺，才足夠發育；但如要使球型更小一點，行寬不動，株距可縮至四公尺。小型品種如坂田早生或長岡六十天等，應採行寬五公尺，株距四公尺，每隔六行或八行留一公尺寬的通路，以便灌水、施肥、殺蟲。

施肥鬆土灌溉要動：定植後十天，可開始施用第一次追肥，每分地用尿素五公斤，點施於株旁，距植株根旁三十公分，然後覆土，如天不下雨，應即灌水。第二次追肥於定植後二十五天開始施用，施用前先鬆土，然後距植株行間一公尺開淺溝，每分地施用尿素十公斤，勻施於溝內再覆土。第三次追肥於定植後四十天開始施用，用尿素二十公斤，鉀肥十五公斤，磷肥二十公斤，混合均勻，條施於行間另一面，中間開溝施入，覆土後灌水。

以上為一般中等土壤的施肥標準，如采土質肥沃，或定植時加施雞糞作基肥，每分地用二十公斤尿

收穫、收量和貯藏：

甘藍生育至一定時期，如不收穫，易起裂球，有損品質。高山十月以後收穫的，因為氣溫降低，裂球發生的很少。八、九月間自然氣溫較高，如結球至七、八分堅實時，最好停止灌



(平伯季)藍甘植栽地麓山雙新

水稻紋枯病 最新特效藥

本劑係日本三共研究陣容新開發之有機化合物"DTAS"為主要成分之水稻紋枯病防除專用藥劑。

《特長》

- 1、對水稻紋枯病之防除具有卓越的效果。
- 2、藥效持久，具有強力殺菌效力。
- 3、不發生任何藥害，可安心使用。

植物保護委員會全力推薦

(農藥字第652號)

三共 水和劑

(三共紋殺可濕性粉劑)



三共株式會社



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號