



(年伯李)藍甘的長生水雨然天靠全完頂山場農山壽福

水，或將結球已堅實的植株扭轉一百八十度，使吸收水份的能力減低，可免裂球發生。但到收穫時碰到颶風，交通斷絕，無法收穫出售時，情形就嚴重了，唯一補救的方法，把十分成熟的甘藍收穫後，運集在陰涼的樹林下或室內，堆積成堆，上搭草蓋，四面通風，可貯藏二星期，不致變質。這種貯藏法，民國五十一一年，夏季八、九月間，橫貫公路迭遭颶風，數次為害，月餘不通車，松柏村仲偉俊照此方法，曾貯藏二十天以上，損耗很小。

至於收量，如果風調雨順，栽培得法，每分地自四千至六千公斤不等，較平地產量並不減少。

**病蟲害的預防：**據作者多年來觀察，高山栽植夏季蔬菜，由於生育期間氣候溫涼，病害發生並不嚴重。但是蟲害防治較為重要，主要蟲害中，葉面害蟲有小菜蛾，可用DDVP五百倍，有奇效。青蟲（粉蝶的幼蟲）可用五〇%馬拉松乳劑二百倍防治。蚜蟲可用三多除蟲菊乳劑五百倍。地下害蟲種類較多，其中金龜子幼蟲為最難防治，其次地老虎幼蟲（切根蟲）在四月底五月初成蟲發生時，每平方公尺深一公寸的體積內，各齡幼蟲可多達一百四十五條，除翻地時，散佈二·五%飛佈達粉劑，或農用DDT粉劑，殺死一部份外，菜苗定植時，仍需用五〇%地特靈乳劑五百倍，或二·五%DDT乳劑一百倍，逐株噴射，每隔二天，繼續噴射一次，可抑制為害。至於金龜子幼蟲深入土中，盛暑時食害成苗的根部，至今尚無理想防治方法。除上述幾種害蟲外，其他害蟲則很少發生。

## 豐年牌農藥



### ◆ 各種病蟲害之防治

農藥登記



豐年牌

■ 興農化工股份有限公司

■ 臺中縣大肚鄉中和村中山路十之一六號 電話烏日局106號

新包裝・新設備

美達松 第五六一號  
特快殺 第五四五七號  
強力保必安 第五三一號  
甲基巴拉松 第二六六號  
馬拉松 第〇〇三號