



農友經驗

我栽培南瓜的經驗

(一)注意播種時期：南瓜(金瓜)是瓜類中最耐低溫的作物，其雌花比較低的溫度下，着生最為良好，因此，南瓜的播種期，一般切勿延過「雨水」，否則日照變長後，雌花着生便不良了。

(二)種子須行消毒：南瓜在幼苗時期，極易發生炭疽病，播種前，宜用「賜保根」拌種消毒，或用「烏斯普龍」一千倍液消毒，洗淨後再播種。

(三)精密管理苗圃：①苗圃切勿過濕，以略為濕潤為宜。②南瓜直播時，應用稻葉切斷一至二寸長覆蓋於苗下的土面，以防下雨時，瓜葉被着賤泥。③育苗期如遇下雨，應事先用塑膠布覆蓋。④定植時，幼苗子葉不可折斷或擦傷，否則，對將來的產量影響很大。⑤在苗圃時期，應每隔七天噴射「大生七十八」四百倍液一次。

(四)注意選擇圃地：應選擇日光照射良好之處，才不致發生徒長現象，葉部粗剛而厚，瓜莖的節間短，雌花才能着生良好，提高產量。

(五)注意施肥方法：南瓜的根羣，對於氮素的吸收力強，一般凡種過南瓜的土地，常變成瘠薄，可是如在地較肥或施用水肥(人糞尿)較多的地上栽培時，亦易發生莖葉徒長或過份

茂盛，而導致開花落果的現象。一般皆視第一個瓜果的着果情形如何來決定施肥量。當南瓜的幼果約長至如飯碗大小時才不會發生落果，此時施用追肥，宜用尿素及氯化鉀，每分地各施用十磅斤，繼續施用兩次。

(六)本圃管理要點：①生育期中瓜株過繁茂時，應摘除部份子蔓，使日光透射良好，或用鋤頭或刀子切斷部份根部，以減低吸肥力，而利結果。②為使南瓜結果良好，其孫蔓應全部切除，使養分積於母蔓或子蔓，以減少養分的爭奪和落果。③如果蜜蜂活動較少時，南瓜的授粉作用減低，故應在天剛亮時行人工授粉工作，將雄花粉塗於雌花的柱頭上，以提高結果率。④南瓜的留果，只能在每一個子蔓上留一個瓜果為原則，先端的雌雄花應及早除去，否則，由於爭奪養分，易於發生落果現象。⑤注意噴藥防治病蟲害，以確保產量。(臺中縣大里鄉仁化村仁化路一二一之一號林青萍)

注意辨別木瓜苗

木瓜是一種不須再嫁接的果樹，因此種植時必須注意辨別雌苗及雄苗，若事先不分別清楚，等到植後長大才發現雌苗，那就太遲了。

下面是我經驗過辨別雌雄苗的簡單方法，茲提供給各農友做參考：中根粗大，邊根細少者即是雄苗，而雌苗就是邊根較多，中根細小而少者即是，注意這點選法絕不會錯。(彰化芬園鄉舊社村新興巷十一號高仁安)

台灣省政府農林廳登記證農藥字第八一五號

三笠飛佈達粉劑 2.5%

ミカサ ヘプタクロル 粉劑 2.5%

最有效最經濟
土壤害蟲劑之霸王

防治一切地下蟲
甘蔗 蔗金針蟲
菸草 草蟻 蛄
蔬菜 菜切根蟲
甘藷 諸甘諸家鼻
馬鈴薯 夜盜蟲
金針蟲 金針蟲



山本ネオサツピラン乳劑

登記證 七二六號

山本DN乳劑 15

登記證 五三五號

柑桔：紅蜘蛛，介殼蟲，蚜蟲
DN乳劑，ネオサツピラン乳劑
混合使用倍數：
DN乳劑：三千倍
ネオサツピラン乳劑：二千倍
即15公升水內使用：ネオサツピ
ラン乳劑7.5cc DN乳劑15cc



進口 東益貿易股份有限公司 台北市南京西路26號二樓 電話 43802
現貨供應 建南農藥行 嘉義市中山路195號 電話 2198