



梅種陰乾貯藏

十二至一月播種

【問】：(一)梅種子的採收及保存方法如何？

(二)梅之播種時期及播種之方法如何？(臺東關山鎮中山路六三號羅任標)

【答】：(一)梅種子採收後以水洗淨並陰乾後，混濕潤之砂裝於木箱中，放於較陰涼之處，到十二月至一月間播種於苗圃。

(二)播種通常用畦播，先作八十公分至一公尺寬之畦，在畦上再行劃橫條點播，條距十五至二十公分，種子每粒距十公分點播，蓋土不可過厚約二二三公分即可，然後再蓋稻草一層並酒水，土壤須保持濕潤，勿使乾燥或過濕。(朱長志)

### 樹果

#### 果樹栽培注意氣候

【問】：(一)果樹休眠溫度是指室外或室內溫度？有那些果樹在冬季所需要的低溫時數較少？又如七度C，需一百小時。則九度C或五度C時要多少小時？

(二)李、梅、樹莓及柿所需要的低溫時數多少？其花芽何時形成？如在冬季以前休眠不足時有何影響？

(三)果樹在不能適應的氣候下栽培，遮蔭的效果如何？何謂半蔭性作用？有那些果樹有那些耐蔭品種？(嘉義香路鄉內甯村瓊唐二號張喜欵)

【答】：(一)果樹休眠溫度是指室外溫度。一般仁果類冬季需要在四、五度C以下之溫度，約八百至一千小時，但品種間也有很大差異；核果類需要較少，冬季能有七度C以下之溫度八百至一千小時，大多數均可打破休眠。近年來曾有育成只須五百五十小時的桃品種。

(二)李、梅、樹莓及柿所需低溫與一般核果類相似，但亦因品種而異，其花芽形成大多在夏末，如冬季過暖，則一部分花芽於初冬開放，影響次年結果。

(三)果樹在不適應的氣候下栽培，遮蔭無甚效果，所謂半蔭性作物，即在生長及生產期間，如能有稍遮蔭時，可以促進其生育，如咖啡樹可謂半蔭性作物，利用其他樹間作遮蔭可使生育佳良。一般其他果樹多喜陽光，如遮蔭時，常致生長旺盛，開花少產量最低，故目前尚少有耐蔭性品種。(朱長志)

### 菜蔬

#### 菜瓜棚式栽培整枝

在主蔓十葉時摘心

【問】：請問菜瓜的整枝方法如何？(臺北士林中山路六二〇巷五十四號蘇學波)

【答】：絲瓜(菜瓜)的經濟栽培多用匍匐栽培方式，故少整枝，但家庭栽培採用棚式栽培方式者，可在主蔓十葉左右時摘心，以促進子蔓伸長，除靠根際之三、四節無法發生子蔓外，其餘各節均能發生子蔓，故計有六、七子蔓，於子蔓二、三節着生雌花，無整枝者主蔓於十三、十六節始有雌花。(王進生)

#### 「松風」胡瓜可留大胡瓜

「濱光」結球後三週可收

【問】：(一)「濱光」和「濱綠」結球白菜，育苗一個月定植後幾天可收穫？又自開始結球幾天能採收？

(二)結球白菜和結球甘藍之軟腐病，有何藥劑可預防及治療？

(三)松風小胡瓜可否留成大胡瓜？若可其果形如何？每條有多重？(雲林莿桐鄉莿桐村光復路一一六號張俊湧)

# 大信牌農藥

應各界農民備用，產品項目大量增加！

品質優良 成分純正 藥效迅速



等用

水稻，蔬菜 豆類，果樹

### 殺菌劑

(紋枯病用) **威力新** 液劑

農藥登記證 802 號

(稻熱病用) **美稻農** 乳劑

農藥登記證 486 號

### 殺蟲劑

殺可新特新新青靈	全級	減拉巴減力蟲	實殺	乳劑	農藥登記證498號
			殺蟲	劑	農藥登記證494號
			松	劑	農藥登記證755號
			多	劑	農藥登記證281號
			松	劑	農藥登記證416號
			靈	劑	農藥登記證415號
			丹	劑	農藥登記證562號
			劑	農藥登記證501號	

大信農化工廠有限公司 台北市天水路十五號 TEL 44309 · 50945