

番茄果實，在正常情形下，是漸漸積集水份和養份而變大的。裂果和水份吸收量有密切關係，主要原因是：由於在乾燥的氣候下，生長中的果實受着抑制，繼而下雨，增加土壤水份，並由根部吸收，上升到果實內部或從果實直接吸收水份，由膨脹變大，果肉果皮增長失調，發生裂果。

(2) 自根部吸收過多的水份。

(1) 番茄果實自果實表面木栓層或從木栓點直接吸收多量水份。


## 預防裂果方法八種

預防番茄果實裂果，減少裂果損失的方法，有下列幾種：

(1) 多施有機質肥料：田間多用堆肥等有機質肥料，遇乾燥氣候，仍能保持土壤水份，使植株吸收所需的水份。

(2) 注意根羣的生長：為使時常能平均地吸收充分的水份，減少裂果，整地前，全面撒布有機質肥料和基肥，勵行深耕，促進番茄根羣的伸深和發展。排水不良地應作高畦，以利排水。

(3) 採用一畦兩行的合掌高支柱法：番茄普通多用直立式支柱，在



果裂防止袋紙套


，為使生長順調起見，定植時宜將花房先向畦溝種植，然後在誘引時再將兩行的花房向內，減少陽光照射。尤其栽培小葉品種或在瘠地栽培，應使花房向畦內，防止裂果。

(4) 增加單位株數：增加單位面積的株數，能夠減少日光照射部份，減低裂果率。

(5) 畦面覆草：定期灌溉：第一次中耕除草追肥後，用稻草覆蓋畦面，保持土壤中水份，兼收抑制雜草生長效果。定期灌溉，補給土壤適當水份。定期撒佈藥劑保護莖葉，使所吸收水份能够順利地由葉子蒸散，當可減少裂果發生的機會。

(6) 保護果實：番茄早收栽培，可以用套紙袋方法防止裂果，即用報紙作中空紙袋套上果房，防止果實吸收水份和照射陽光。紙袋不宜封底，以免袋中溫度升高，引起落果或高溫障礙。強度的摘心也會引發裂果，應該注意。

(7) 保護果實：番茄早收栽培，可以在收穫前發生，因此，採收期下雨，如果部份開始着色，應立即採收追熟，保持品質，減少裂果損失。



培栽掌合行二

真方便！

售均行農藥・會農省全

## \* 請用安全可靠的水田除草劑 多谷粒劑 TOR \* Granular (農藥登記證第665號)

- ◎ 植物保護審議會，農林廳推廣水田用除草劑。
- ◎ 每甲地用藥量30公斤，插秧後三至五天用手均勻撒佈即可，施藥後請保持田面水深三公分三天，以後缺水亦不影響其殺草效果。
- ◎ 可與肥料、粉劑或粒劑混藥混合使用。
- ◎ 施用多谷粒劑後，完全不必再行人工除草。
- ◎ 對水稻不會發生藥害，對人畜、魚介類無害，可安全使用。

臺灣區經銷：臺中縣霧峰鄉草湖路二號（電話63號）  
正豐化學股份有限公司  
總代理：臺北市漢口街一段一四四號七一二室（電話三六一七七）

標商登記公司哈門羅國美\*