

# 發財農藥

帶給您豐收發財

請用：  
**萬靈松 乳劑**

二、三化螟蟲特效藥，低毒速效。

**菜王 乳劑**

蔬菜害蟲特效藥，低毒性強效果。

**富稻多 乳劑**

稻苞蟲特效藥，速效。

強力 **加收成** 5% 水懸粉

紋枯病特效藥。

**發財可濕性** 50% 粉劑

飛蟲、浮塵子、香蕉粉介殼蟲特效藥。

鳳梨發乳劑、大減速乳劑、美農乳劑、馬拉松25%水懸粉、保滿丹粉劑及其他各種乳劑，可濕性粉劑、粉劑、片劑、種類齊備，現貨供應。

(上記各種農藥均有登記在案)

成份正確  
品質最優



好消息：發財農藥由二期作開始自營，以最新技術與設備，改良品質，並派外務員直接服務諸位，敬請指導惠顧。



亞洲化學股份有限公司

嘉泰企業股份有限公司

公司：臺北市中正路1140號之4(二樓) 電話45815號  
工廠：臺北縣中和鄉四十張 電話92-2430號

## 黃香瓜和越瓜的水田裡作栽培法

黃香瓜和越瓜，都是生育期較短，生長快速而強健，耐濕性也較強的瓜類，對於土壤，選擇又不嚴格，所以，很適宜中南部第一期或第二期水稻收割後的水田裏作栽培。

；總之，無論那一期裏作，都是越早種植越有利。下面介紹的糊仔播種法和育苗栽培法，都是在水稻收割前播種的方法。

### 注意提早播種

水田裏作，以不影響前作和後作才為有利，為要把握裏作的休閑期，應利用水稻收割前先行播種，同時中南部的氣候也以裏作初期較後期適宜瓜類的生育，因為第一期裏作的後期(六至七月)，常易遭受豪雨或颱風的損害；第二期裏作的後期(十一月至十二月)，因為氣溫降低而生育不良

### 糊仔播種法

在水稻收割前十至十五天，每隔八至十行水稻將稻株向左右壓開。在這壓開的行間，每隔四至五株水稻築一小土堆，土堆中央以脚根踏一小穴，施下三要素化學肥料一小把(約半壺兩)作基肥。  
然後在基肥周圍播下優良種子四至六粒，再以腐熟堆肥覆蓋，防止乾燥和大雨沖失種子。

### 育苗定植法

育苗也需在水稻收割前十五天開始，普通採用塑膠袋或特製苗床育苗較為方便。

塑膠袋育苗法是以十公分寬，十五公分長的塑膠袋，裝入混有腐熟堆肥的園土，稍加壓實後下播三至四粒種子，將塑膠袋整齊排列在一起以便管理。水稻收割後即行定植。

特製苗床的做法，以水田泥土調成泥狀後，在鋪有一層稻糠(粗糠)的地上做成十公分高的平畦，待泥土稍乾後，用刀將其割成十公分見方的許多小土塊，以便以後移植。在每一

### 邱阿昌

小土塊上，用手指壓一小洞，塞入少許疏鏝，然後在其周圍下播三至四粒種子，播完後全畦覆蓋一層腐熟堆肥，待水稻收割後即可移植。

### 整地和作畦

水稻收割後，即刻將稻草撇開，並行小作畦(小培土)。糊仔栽培的，將瓜苗左右各第二行的稻株牽起，培於第一行稻株上便成小畦。育苗移植的，也以同樣方法先做成小畦後再定植。

小作畦後十天可開始第一次大作畦，再經十天行第二次大作畦。大作畦的方法，是將小作畦未牽起的稻株，依次牽起培成大畦。培土時雖不必

將土壤打得細碎，但需用手或鋤將土壤整平，使土壤密接，並覆蓋一層稻草。這種逐次作畦的方法，不但可以調節農家勞力的分配，同時又可以防止雜草叢生，保持土壤疏鬆及容易施肥管理等優點。（請參看下列圖）。

### 施肥灌水

西瓜和甜瓜都要及早施肥。

水稻收割後，小作畦之前，每十公畝（一分地）施用堆肥五百公斤於瓜苗周圍，堆肥上再施用硫酸二十公斤，過磷酸鈣二十公斤和氯化鉀五公斤的混合化學肥料，然後行小作畦。


第一次大作畦前，每十公畝再用十五公斤的硫酸，十公斤過磷酸鈣和氯化鉀五公斤於小作畦兩旁的土隙中再行培土。第二次大作畦前，只用十五公斤硫酸如上法施用即可。

以後，視需要施用尿素液補助發育。


第一期裏作時，因為常有豪雨所以應經常保持土壤濕潤，畦溝更宜保留少量水份，使瓜類根羣能適應雨後的土壤，但在豪雨時需特別注意排水，以免根部淹沒窒息而死。

第二期裏作時，雨水較少，可以保持土壤半乾半濕狀態。


### 其他管理



每八至十行水行 每行栽一瓜



水田瓜苗小，將第一畦（畦）後，第二畦（畦）後，第三畦（畦）後，第四畦（畦）後，第五畦（畦）後，第六畦（畦）後，第七畦（畦）後，第八畦（畦）後，第九畦（畦）後，第十畦（畦）後。



將，天十經再左起，畦大成一畦（畦）後，天十經再右起，畦大成一畦（畦）後。



最將，天十經再左起，畦大成一畦（畦）後，天十經再右起，畦大成一畦（畦）後。

水稻收割後即行疏苗，每穴留一至二株已足，瓜苗本葉五至六葉時摘心一次，使生三至四枚子蔓，子蔓五至六葉時再摘心一次，促進孫蔓早日結果。

生育期注意防止黃守瓜、青蟲、蚜蟲和露菌病、白粉病、炭疽病等發生，可以用「大生」四百倍（白粉病「可用利生」）加用「賽文」一千倍和「馬拉松」乳劑八百倍防治。至結果期，以水解蛋白質加可濕性「馬拉松」粉劑四百倍誘殺果實蠅；結果後用「力拔山」乳劑一千倍亦可驅除之。

其他如小鳳西瓜、蜜寶西瓜、秀寶西瓜等，也可以參照這種方法栽培。

## 聞名世界之植物ホルモン劑



# ナフサク錠

## 農富收片

農藥登記證 727 號

本劑係日本三共株式會社出品，為目前日本農民最普遍使用之植物賀爾蒙製劑，無論撒佈或浸漬均能迅速滲透植物體內促進農作物之生長提早發芽發根，防止果樹瓜類落果之功效，尤其對鳳梨之調節花期更具有卓越之效果。

## 三共株式會社

日本東京都中央區銀座3の2

總代理

中國化學製藥股份有限公司

經銷處 裕隆商行 臺中市建國路一六七號