

發財農藥

帶給您豐收發財

請用：
萬靈松 乳劑

二、三化螟蟲特效藥，低毒速效。

菜王 乳劑

蔬菜害蟲特效藥，低毒性強效果。

富稻多 乳劑

稻苞蟲特效藥，速效。

強力 **加收成** 5% 水懸粉

紋枯病特效藥。

發財可濕性 50% 粉劑

飛蟲、浮塵子、香蕉粉介殼蟲特效藥。

鳳梨發乳劑、大減速乳劑、美農乳劑、馬拉松25%水懸粉、保滿丹粉劑及其他各種乳劑，可濕性粉劑、粉劑、片劑、種類齊備，現貨供應。

(上記各種農藥均有登記在案)

成份正確
品質最優



好消息：發財農藥由二期作開始自營，以最新技術與設備，改良品質，並派外務員直接服務諸位，敬請指導惠顧。



亞洲化學股份有限公司

嘉泰企業股份有限公司

公司：臺北市中正路1140號之4(二樓) 電話45815號
工廠：臺北縣中和鄉四十張 電話92-2430號

黃香瓜和越瓜的水田裡作栽培法

黃香瓜和越瓜，都是生育期較短，生長快速而強健，耐濕性也較強的瓜類，對於土壤，選擇又不嚴格，所以，很適宜中南部第一期或第二期水稻收割後的水田裏作栽培。

；總之，無論那一期裏作，都是越早種植越有利。下面介紹的糊仔播種法和育苗栽培法，都是在水稻收割前播種的方法。

注意提早播種

水田裏作，以不影響前作和後作才為有利，為要把握裏作的休閑期，應利用水稻收割前先行播種，同時中南部的氣候也以裏作初期較後期適宜瓜類的生育，因為第一期裏作的後期(六至七月)，常易遭受豪雨或颱風的損害；第二期裏作的後期(十一月至十二月)，因為氣溫降低而生育不良

糊仔播種法

在水稻收割前十至十五天，每隔八至十行水稻將稻株向左右壓開。在這壓開的行間，每隔四至五株水稻築一小土堆，土堆中央以脚根踏一小穴，施下三要素化學肥料一小把(約半壺兩)作基肥。然後在基肥周圍播下優良種子四至六粒，再以腐熟堆肥覆蓋，防止乾燥和大雨沖失種子。

育苗定植法

育苗也需在水稻收割前十五天開始，普通採用塑膠袋或特製苗床育苗較為方便。

塑膠袋育苗法是以十公分寬，十五公分長的塑膠袋，裝入混有腐熟堆肥的園土，稍加壓實後下播三至四粒種子，將塑膠袋整齊排列在一起以便管理。水稻收割後即行定植。

特製苗床的做法，以水田泥土調成泥狀後，在鋪有一層稻糠(粗糠)的地上做成十公分高的平畦，待泥土稍乾後，用刀將其割成十公分見方的許多小土塊，以便以後移植。在每一

邱阿昌

小土塊上，用手指壓一小洞，塞入少許疏鏝，然後在其周圍下播三至四粒種子，播完後全畦覆蓋一層腐熟堆肥，待水稻收割後即可移植。

整地和作畦

水稻收割後，即刻將稻草撥開，並行小作畦(小培土)。糊仔栽培的，將瓜苗左右各第二行的稻株壟起，培於第一行稻株上便成小畦。育苗移植的，也以同樣方法先做成小畦後再定植。

小作畦後十天可開始第一次大作畦，再經十天行第二次大作畦。大作畦的方法，是將小作畦未壟起的稻株，依次牽起培成大畦。培土時雖不必