

將土壤打得細碎，但需用手或鋤將土壤整平，使土壤密接，並覆蓋一層稻草。這種逐次作畦的方法，不但可以調節農家勞力的分配，同時又可以防止雜草叢生，保持土壤疏鬆及容易施肥管理等優點。（請參看下列圖）。

施肥灌水

西瓜和甜瓜都要及早施肥。

水稻收割後，小作畦之前，每十公畝（一分地）施用堆肥五百公斤於瓜苗周圍，堆肥上再施用硫酸十公斤，過磷酸鈣二十公斤和氯化鉀五公斤的混合化學肥料，然後行小作畦。

第一次大作畦前，每十公畝再用十五公斤的硫酸，十公斤過磷酸鈣和氯化鉀五公斤於小作畦兩旁的土隙中再行培土。第二次大作畦前，只用十五公斤硫酸如上法施用即可。

以後，視需要施用尿素液補助發育。


第一期裏作時，因為常有豪雨所以應經常保持土壤濕潤，畦溝更宜保留少量水份，使瓜類根羣能適應雨後的土壤，但在豪雨時需特別注意排水，以免根部淹沒窒息而死。

第二期裏作時，雨水較少，可以保持土壤半乾半濕狀態。


其他管理



每八至十行水行 每行栽一瓜



水田瓜苗小，將第一畦（小）後，第二畦（小）後，第三畦（小）後，第四畦（小）後，第五畦（小）後，第六畦（小）後，第七畦（小）後，第八畦（小）後，第九畦（小）後，第十畦（小）後。



將，天十經再左起，畦大成一畦（畦作大次一）



最將，天十經再左起，畦大成一畦（畦作大次一）

水稻收割後即行疏苗，每穴留一至二株已足，瓜苗本葉五至六葉時摘心一次，使生三至四枚子蔓，子蔓五至六葉時再摘心一次，促進孫蔓早日結果。

生育期注意防止黃守瓜、青蟲、蚜蟲和露菌病、白粉病、炭疽病等發生，可以用「大生」四百倍（白粉病「可用利生」）加用「賽文」一千倍和「馬拉松」乳劑八百倍防治。至結果期，以水解蛋白質加可濕性「馬拉松」粉劑四百倍誘殺果實蠅；結果後用「力拔山」乳劑一千倍亦可驅除之。

其他如小鳳西瓜、蜜寶西瓜、秀寶西瓜等，也可以參照這種方法栽培。

聞名世界之植物ホルモン劑



ナフサク錠

農富收片

農藥登記證 727 號

本劑係日本三共株式會社出品，為目前日本農民最普遍使用之植物賀爾蒙製劑，無論撒佈或浸漬均能迅速滲透植物體內促進農作物之生長提早發芽發根，防止果樹瓜類落果之功效，尤其對鳳梨之調節花期更具有卓越之效果。

三共株式會社

日本東京都中央區銀座3の2

總代理

中國化學製藥股份有限公司

經銷處 裕隆商行 臺中市建國路一六七號