

農友經驗



糊仔越瓜經驗談

爲使土地高度利用，在第一期作物未收割前糊仔越瓜，可增加收益。因爲在採收期正好早期越瓜已收完，而晚期越瓜尚未應市，故價格較高。

品種須選擇早熟品種，如在來種的「七十日早」或「蟻蟻包」，這兩種比較早熟，產量亦不錯，凡在清明前十至十五天插秧的稻田，均可利用栽培。糊仔越瓜在芒種前後（稻齊穗時期），將每十行稻株移至左右二旁，再每隔二株稻（每一·六臺尺）泥土挖上作個小平壟做播種穴，然後每穴約播種三四粒。（但以排水良好的砂質土或沙壤土最爲適合），蓋上細堆肥約一·五公分，經十天發芽後，施行間拔，每穴留二株，並施硫酸銨在周圍，每分地約四公斤，又在間稻前十天，再施肥一次。

割稻以後稻稈須除去並即刻培土，將兩旁稻株用鋤頭鋤除，再將隔行兩行用犁犁開，每分地施用硫酸銨三十公斤，過磷酸石灰三十公斤，氯化鉀三十公斤，水肥或堆肥三千公斤，再用犁翻過來，把其餘稻株壟盡。然後用人工培土及耙平壟，長約八寸左右要分壟，同時要注意壓壟，因當時正是颱風季節如不壓壟會被風刮壞，約經過七天左右即能開花結果。在開花後應用水解性蛋白質與馬拉松粉劑四百

倍液混合噴射，以誘殺瓜蠅爲害，（噴藥時應選上午九點至十一時噴射）最好每隔七至十天噴一次，連續二、三次。又露菌病在初期很少發生，如開花後發現病株可用大生七八加水四百倍預防，每十天一次即可。通常在開花後半個月即可陸續採收，平均一分地可收三千臺斤左右。（新竹縣香山鎮朝山村四號林錦澤）

木瓜密生法

各位農友們！您想使您們菜園中庭院裏的木瓜多生嗎？現在將我栽種木瓜，使它們多生的方法寫出來，供各位參考！這種方法，大概只適用於菜園或庭院內種植四、五棵的，因爲如使用在大的木瓜園中，時間和人工消耗很大。

當雌株木瓜開花時，您就趕緊去採雄株的花朵，（需要良好品種的，以後生出的果實才會良好）將其採回後依我的方法去做。

（一）去掉雄花的花瓣，留下花托，在去掉花瓣時要小心不要碰到蕊，以免打掉花粉。

（二）然後將其塗抹在雌花的柱頭上。這朵雄花可以連續塗抹幾朵雌花。經過這一次塗抹後，這朵雌花便會結果，如果您想要使它能密生重重，只要利用此法，每當一朵雌花開花時，即行塗抹便可。



陳煥城農友

（號陳煥城）

八江農藝新黑田五寸人參重要啓事

一、敝社育成之「新黑田五寸人參」現於日本國內的五寸人參中獲全國最優良品種的名聲及絕大好評，在琉球、韓國及貴國亦因此品種爲正紅心、豐滿、鮮麗、整一，以致受農戶認識作爲大集團栽培用蒙各農友愛用實爲感謝。

二、此品種在貴地的普及幸蒙「臺灣農產企業公司」總經理二年內訪日三次視察現場蒙蒙各種商協協助推銷在短短二年內將原以種植美國及日本其他品種的全部地區爭爲改種敝社「新黑田五寸人參」的地區，本年決定將臺灣總代理委託「臺灣農產企業公司」辦理，敬請各位種植商及農友仍以一本愛護之意繼續推銷及愛用，敝社在品種上當繼續以精益求精不負各位所望爲各位之增產而努力。

三、現各位農友採購時均僅指明「新黑田」以致已有其他輸入商輸入日本其他牌子的「新黑田五寸人參」利用其同名欲圖魚目混珠藉名銷售，查二年來在貴地獲得優良好評的「新黑田五寸人參」係敝社出品，敬請顧客採購時認清「八江農藝YAE SEED」才是絕對無誤的真正品種以免誤購其他牌子爲幸。

日本長崎縣諫早市厚生町
八江農藝株式會社
臺灣代理店 臺灣農產企業公司

種植胡蘿蔔 請指明八江農藝育成

YAE SEED 新黑田五寸人參

只有此品種是正紅心、豐滿、鮮麗、整一，去年度風濕全省的人參王，內外銷均爭先採購的優良品種，每公升裝運郵費115元

要農作物增加收量增加甜味 提高收成 請用酵素劑香蘭

みかど交配 新夏秋の甘藍

耐暑耐病性最強春夏秋均可播種移栽60天即可收成，每球二斤半的平型堅實肉質柔軟食味最優的品種絕無高溫乾燥時最易發生的結球腐爛及變球型雨期最多的腐敗也絕不發生的最優良品種 每臺兩100元

宇治交配 超極早生 脫普甘藍

耐暑耐病性特強，在春季至初夏高溫多濕氣候下栽培結球率特高移植後五○天可收成每球2斤半左右球體密形體扁平不美觀，品質優美，收量多係夏季蔬菜高價之極端期易于出售之優良品種 每臺兩80元

其他夏天可種植之優良 高麗菜（耐熱耐雨耐腐爛）

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① 宇治交配 USM 一號甘藍 | ⑤ 高麗交配光悅甘藍 |
| ② 宇治交配綠寶甘藍 | ⑥ 高麗交配秀悅甘藍 |
| ③ 坂田交配綠寶甘藍 | ⑦ 合田交配兵庫三號甘藍 |
| ④ 坂田交配中早生甘藍 | ⑧ 合田交配黑葉理想甘藍 |

（目錄及說明書附郵二元函索即寄）

美國種グリーンピース（百富種）及其他各種均入貨

臺灣總代理
臺灣農產企業公司
臺北市迪化街一段八十六號

蘆筍種子
美國華盛頓加州 500
原封罐裝現貨供應