



農業信箱

梗之雜草亦可能受其為害，這種受感染的雜草當然亦可成爲下次感染的病源。因此在防除紋枯病，清除及燒毀田塊的雜草，是不可缺的工作之一。

(三)關於紋枯病之發生都偏於田邊的理由，可能有下幾點：

- (1)一般紋枯病菌核輕，易浮於水面，因此在整地準備插秧時，使用鐵耙、撈礮等，會把菌核排向田的四周邊界。
- (2)田中的灌溉水或風等，都有可能把菌核吹或流到田邊。
- (3)田邊雜草感染紋枯病，菌核掉落當以田邊爲多。

由上三點可能田邊的菌核較多，因此發病亦當以田邊較嚴重，而漸次往田中感染。(周廷光)

病蟲害

防治香蕉莖象鼻蟲

蕉株注射「蕉特靈」

【問】：香蕉受了象鼻蟲爲害，因買不到「蕉特靈」，想用BHC注入蕉株，會影響發育嗎？其他有何種藥品？(苗栗頭屋鄉明德村一八五號徐永福)

【答】：香蕉莖象鼻蟲幼蟲爲害的蕉株，目前僅能用「蕉特靈」注射才能防治。如用BHC或其他藥劑注射，蕉株會引起藥害而腐爛。「蕉特靈」是由臺中縣霧峰鄉草湖路二號正豐化學股份有限公司製造供應。(徐茂樟)

澈底防治稻紋枯病

適當處理田埂雜草

【問】：本人稻田(嘉南八號)發生紋枯病。在約一分多地內詳細觀察，紋枯病的發生都偏重田岸邊。我經過調查一七三三株結果，發病者共一六株。即田的四圍最外一行佔六二株，第二行佔三一株，第三行佔二三株，共計一六株。據說紋枯病的菌核係寄生在田岸的雜草，由雜草傳染入稻株的，是否確實。如確實應將此事宣佈，並通知農民事前適當處理田岸雜草，以利增產。(屏東林邊鄉仁和村五八號陳日新)

【答】：(一)水稻紋枯病的感染，多由上年或上期發生之紋枯病菌核掉落在田中，待再插秧後灌水時菌核浮於水面，遇適當環境侵入葉鞘感染發病。

(二)紋枯病除感染水稻外，其他五穀類及禾本科雜草，有許多種亦可被感染，因此田

紅豆

紅豆適合山地栽培

【問】：(一)海拔七百餘公尺山坡地，是否適宜種植紅豆？

- (二)播種時期何時？
- (三)每分地種子要多少？何處有售？
- (四)株行距約多少？
- (五)發芽後是否灌水？施肥管理如何？
- (六)病蟲害如何防治？
- (七)收穫時期何時？(臺中和平鄉上谷關王松興商店廖志遠)

【答】：(一)紅豆原產我國東北，本省自民國六年開始由山地同胞試種成功，因此，在海拔七百多公尺的山坡地適宜栽培。

(二)本省山地栽培紅豆之適宜播種期爲五月至六月。

(三)每公頃需種子三十五公斤，種子在屏東潮州種子商有出售。

(四)行距四十分，株距十五公分，每穴播種三粒。

(五)管理：(1)種子發芽前不要灌水，以免

台灣省政府農林廳登記證農藥字第八一五號

三笠飛佈達粉劑 2.5%

ミカサ ヘブタクロル 粉劑 2.5%

- 防治一切地下蟲
- 甘蔗 金針蟲
 - 菸草 蝶 切根蟲
 - 蔬菜 夜盜蟲
 - 甘藷 甘藷象鼻
 - 馬鈴薯 金針蟲
 - 金針蟲 蝶 金針蟲



最有效最經濟土壤害蟲劑之霸王

山本ネオサツピラン乳劑

登記證五三五號

- ◎柑桔：紅蜘蛛、介殼蟲、蚜蟲
- ◎DN乳劑，ネオサツピラン乳劑 混合使用倍數：
- DN乳劑：三千倍
- ネオサツピラン乳劑：二千倍
- 即15公升水內使用：ネオサツピラン乳劑7.5cc DN乳劑5cc



進口 東益貿易股份有限公司 台北市南京西路26號二樓 電話 43802
 現貨供應 建南農藥行 嘉義市中山路195號 電話 2198