

羊養

撒能乳羊三週發情一次

山羊孕期平均一五〇天

【問】(一)母羊生育期間發情，是否可交配？

(二)母羊產後幾天生產？

(三)母羊產後多日可去角？老母羊是否也可去角？去角後有何好處？

(四)去角是用什麼藥劑？如何點藥？(雲林二滿鄉二滿東村一〇九號廖岱)

(五)撒能種母羊的發情週期約三星期一次？普通山羊發情之季節，自九月至翌年一、二月間，但此期間以外亦有發情者。

(六)山羊妊娠期平均一百五十天，最短者一百四十三天，最長者一百六十天。

(七)母羊生產後不可立即配種，最少需待二三個月以後才可配種。

(八)仔羊生後七十五天內即可去角，老母羊的角已生長出來，去角方法較複雜，否則易引起外傷而傳染疾病。半去角後的好處是管理方便，如大羣羊在一起時，不會因打架而受傷，特別是對妊娠的羊，不會因互相打架而發生流產。

(九)去角是用雷性鈉在角的生長處磨擦，破壞角的組織。(黃立羣)

產水

鰻魚人工餌料

尚在試驗階段

【問】：年前閱讀貴刊十五卷十

二期所刊載，鰻魚養殖的方法，對養鰻具有濃厚的興趣，但尚有疑問請轉作者安先生解答。

鰻魚飼料的下什價錢不定，而供應也較困難，因此想改用乾飼料飼養，是否較下什魚的成本低？其成長速度如何？一級魚粉粗蛋白質六十九%，酵母四十%，大豆粉四十分，米糠十四%，這樣的飼料比率配合是否可以？或要加以改善？(彰化埔心鄉鯤村員麗路六十七號李錫銘)

【答】：養鰻的傳統飼料多係海產的下什魚，近年因海洋漁業作業船隻之趨向遠洋

米糠豆餅為主要配合飼料。

(二)養鰻參考書據所知很少，多係外文書

須沙蝦。在養鰻池中可混養虱目魚，蝦池水深

一、五—二、五公尺。

(三)不論草蝦或沙蝦均不能在池中產卵繁殖，一般漁民養殖用的蝦苗均由各大河川之入海口捕撈而來，現在已着手施行人工繁殖。

鰻苗多以池中的天然飼料為主，稍大後

以事增產推廣，採捕蝦苗的盛期是沙蝦十一月，草蝦八—十月，出售蝦苗的地方

可分二處，南部以東港、小港、安平、恆春及林邊為最多，北部則以宜蘭為蝦苗集散中心。

鰻苗多以池中的天然飼料為主，稍大後

則以人工飼料之田螺肉，再大則以小魚類及米糠豆餅為主要配合飼料。

(四)本社代售之農業要覽漁業編有簡單的養鰻資料(草蝦)。

羊的角已生長出來，去角方法較複雜，否則易引起外傷而傳染疾病。半去角後的好處是

管理方便，如大羣羊在一起時，不會因打架

而受傷，特別是對妊娠的羊，不會因互相打

架而發生流產。

(五)去角是用雷性鈉在角的生長處磨擦，破壞角的組織。(黃立羣)

【問】：(一)請問養池裡是否可混養其他魚類，蝦池水深須幾公尺最為適宜？
(二)蝦苗何處有售？飼料是什麼？
(三)養鰻參考書何處有售？實刊所售魚業總論裡是否有養鰻資料？

(四)目前臺灣的蝦製餌是否有外銷。(彰化員林鎮大陳里員集路五號張鶴)

(五)所問養鰻諸問題，未知是那

上是否較下什魚低，照你的信中提示，上品的一級魚粉和大豆粉，再加上酵母和清糠，其成本可能要比現在最好的下什魚每公升三元高，可能不太合算。同時來信所說的這種乾飼料，在鰻魚的摺食習慣上是否順利，因未作試驗不得而知。你的配合表，可能寫錯，照表算來，比率竟達一五四%，假如不錯的話，我認為那是應該加以改善的。(安可倫)

蝦池混養虱目魚 蝦餌用米糠豆餅



農藥登記證第 382 號



ORTHO 50% WETTABLE (50% CAPTAN)

●最新農用殺菌劑●
使用便 毒性低 効果好 收益多

果樹：梨・赤星病・黑星病
葡萄・晚腐病・褐斑病
鳳梨・心腐病・桃・縮葉病
蔬菜：西瓜・蔓割病・瓜類・炭疽病・露菌病・蕃茄・馬鈴薯
・疫病・菜豆・炭疽病
胡瓜・露菌病・炭疽病
葱・菠菜・苗立枯病

• 特效 •

規定為速殺水和等藥劑登記證字號農粉一號印有中文說明各新包裝予，改換

經銷處泰洋股份有限公司 臺北市重慶北路2段108號 電話：44994

製造廠 Chevron Chemical Company
ORTHO Division U. S. A.

東益貿易公司 臺北市南京西路26號2樓 電話：43802
總代理惠農股份有限公司 臺北市長安東路2段16號 電話：52093