

農友經驗



如何防蝸牛吃絲瓜

今年二月中旬，我在溝邊種下幾株絲瓜苗（俗名菜瓜），經過幾天，瓜苗生長良好，但卻遭受蝸牛襲害，咬斷苗莖，以致枯萎，我非常惋惜與憤恨，決意找出蝸牛將它摔碎，然而，蝸牛夜間出來侵害作物，白天均避在蓬草中，不易尋着。後來我想了一個辦法，到附近一家菸葉寮檢拾少許殘破菸葉，拿回家中，將瓜苗重植，並將殘破菸葉捲圍在瓜苗四周，則蝸牛不敢靠近，得以保全瓜苗。（臺中市南屯區新生里三段廿四號張清一）

我如何養剛出生的小兔

現在社會上飼養兔子的人愈來愈多，可是每當小兔出生以後，許多人都不知道處理的方法，就隨便讓母兔自己去帶小兔，以至於幼兔常因種種的原因，死亡率非常高，這實在是一種莫大的損失。

當小兔出生以後，我們最好將幼兔放置一個溫暖的木箱子裡，木箱的最下層鋪一層柔軟的棉布，而後把母兔生小兔以前在身上的毛拔下，再和棉毛混在一起，再鋪在棉布上，然後把幼兔放在棉毛上，如此可以保持幼兔的溫暖，以後我們就可以安心地使母兔按照幼兔的需要，供給幼兔哺乳。

這麼一來就可以避免一般農家隨

便的讓母兔自己帶幼兔，而幼兔常因入稻草堆內，母兔無從尋覓或被草纏住窒息而死，那將是很可惜的。

所以這種使母兔和幼

兔隔離的方法，是很成功的，效果也很顯著。這麼不但可以防止母兔自己帶小兔，而在哺乳期間在不知不覺中將幼兔踏死，而且可以使得每隻幼兔長得很平均，減少幼兔的死亡率。（臺北縣三峽鎮八張里一八六之二號鄭禎祺）

我栽培糊仔甘薯的方法

在第二期插秧之時，即將株與株的間距定為七臺寸×七臺寸，每插二行空一行，植後的管理和普通的相同，在第三次除草時將空行藥畦，以便種植甘薯，秧田水排乾後（農曆八月末至九月初）即可將薯苗種植畦上，以水平播為宜，盡量將苗與苗連接（意思是密植）。

植後約二十日即可施下少許氮肥，助其生長，割稻前再施第二次肥（氮、鉀），收割後將要施的氮鉀肥及有機質肥全部施下後培土。

插秧時仍如普通法，一次插九行，實插六行，這比插後再移開一行方便，不但省力且稻株間距平衡，可助其發育，比普通八寸×八寸通風良好，噴藥管理都方便，又可增加分蘗力，減少病蟲害，並不影響稻谷的產量。（彰化縣漢湖鎮湖東里大溪路九號洪恭想）

水稻紋枯病 最新特效藥

本劑係日本三共研究陣容新開發之有機化合物"DTAS"為主要成分之水稻紋枯病防除專用藥劑。

《特長》

- 1、對水稻紋枯病之防除具有卓越的效果。
- 2、藥效持久，具有強力殺菌效力。
- 3、不發生任何藥害，可安心使用。

植物保護委員會全力推薦

（農藥字第652號）

三共モノガル水和劑

（三共紋殺可濕性粉劑）



三共株式会社



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司

台北市襄陽路23號

